Mat. med: 518. m

Medicin
pharmacol.

Kapp
52.

cf. Kraus

Recepttaschenbuch

über den

zweyten Theil

der

preussischen

Landespharmakopoe,

herausgegeben

von

Dr. Georg Ludw. Carl Kapp,

praktizirendem Arzte zu Baireuth, und Ehrenmitgliede der botanischen Gesellschaft in Regensburg.

R

Nürnberg, 1809.

im Verlage der Steinischen Buchhandlung.

BIBLIOTHECA
REGIA
MONACENSIS.

Seiner

Hochwohlgeborn

Herrn

Kammer- und Medicinal-Direktor

Bomhard,

widmet

mit den Gefühlen der innigen Hochachtung

diese Schrift

Baireuth,
im Augustmonat 1808.

der

Verfasser.

Vorrede.

Nicht für den Pfuscher, oder für den, der blos nach Receptformeln hascht, ohne das Innere der Medizin ergründet zu haben, sondern blos für den, der sich eine Totalanschauung der Medizin zu eigen machte, dem es aber an Uebung noch fehlt, allenthalben richtige Combinationen zu treffen, habe ich diese Schrift verabfaßt.

Ich habe dazu die preussische Pharmakopoe als Grundlage gewählt, weil sie als die zweckmässigste bis jetzt angesehen werden kann.

Die Steinische Buchhandlung in Nürnberg, die ohnedem die preussische Pharmakopoe von Juch übersetzt (die schon die zweyte Auflage erlebte), verlegte, hat auch diesen Verlag bereitwillig angenommen.

Warum ich den zweyten Theil der Pharmakopoe bearbeitete und nicht über alle beide Theile schrieb, geschah blos um manche Wiederholungen zu vermeiden.

Das spezielle der Theropie habe ich absichtlich hier vermieden.

Die Kenntniß dieser Doktrin, so wie der übrigen Zweige der Medizin, wird hier schon vorausgesetzt.

Einige Formeln, die ich durch Lektüre in den Schriften berühmter Aerzte fand, habe ich hier mit eingeschaltet, jedoch ist stets der Name dabei angegeben, um kein Plagiat zu begehen. Alle die übrigen Formeln, wo kein Nahme unter denselben steht, gehören lediglich mir zu.

Sehr lieb würde es mir seyn, wenn billige Recensenten, die etwa vorgefallenen chemischen oder pharmazevtischen Fehler berichtigen würden, jedoch bitte ich, daß man das Ganze beurtheilen, und sich nicht auf Kleinigkeiten einlassen möge.

Baireuth,
im Augustmonat 1808.

Der Verfasser.

Acetum aromaticum.

(Loco aceti bezoardici et prophylactici).
(Gewürzessig, Spizbubenessig).

Dosis.

Von zwey Drachmen bis einer halben oder ganzen Unze

1) entweder für sich
2) oder in Mixturen.

Formel.

Rec. Radic. Valer. minor.
ʒij.
infund. ▽ font. fervid. suffic.
quantit. p. $\frac{1}{4}$ hor.
Colat.
℥iv.
add.
Acet. aromat.
℥ij.
Syrup. flor. aur.
℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Acetum concentratum.

(Loco Aceti per frigus concentrati).

Dosis.

Von zwey Drachmen bis einer halben Unze in Mixturen.

Formel.

Rec. Acet. concentrat.

℥j.

Syrup. flor. aur.

℥jß.

M. D. S.

Stündlich einen Theelöffel voll zu nehmen.

Acetum destillatum.

(Destillirter Essig).

Dosis.

Zu einigen Quentchen unter das Getränk.

Formel.

Rec. Acet. destill.

℥ij.

Syrup. Cerasor.

℥j.

M. D. S.

Bis zur wohlschmeckenden Säure unter das Getränk zu mischen.

Acetum rosarum.

(Rosenessig).

Ist blos als Riechmittel zu gebrauchen.

Acetum rubi idaei.

(Himbeeressig).

Dosis.

Von zwey Drachmen bis einer halben Unze in Mixturen.

Formel.

Rec. Acet. rub. id.

℥ij.

D. S.

Zwey Eßlöffel voll in ein Seidel Wasser zu thun und dann nach und nach zu verbrauchen.

Acetum Rutae.

(Rautenessig).

Dosis.

Von zwey Drachmen bis zu einer halben Unze in Mixturen.

Formel.

Rec. Acet. rut.

℥iv.

Mucilag. gumm. arab.

℥ij.

Camphor.

ʒß.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Acetum saturninum.

(Extractum Saturni).

(Bleiessig).

Der Bleiessig wird nur äusserlich angewendet und zu diesem Endzwecke mit Wasser oder Oehl befeuchtet. gemischt.

Acetum scilliticum.

(Meerzwiebelessig).

Dosis.

Von einer halben bis ganzen Drachme. In grössern Gaben erregt er Erbrechen.

Formel.

Rec. Acet. scillit.

℥j.

Extr. gentian. rubr.

℥ij.

▽ aromat.

℥iv.

Tinct. As. foetid.

ʒj.

Syrup. cortic. aur.
℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Acidum aceticum.

(Alcohol aceti).

(Essigsäure).

Dosis.

Wird blos als Riechmittel bei Ohnmachten und Schlagflüssen von Schwäche gebraucht.

Acidum benzoicum.

(Flores benzoes).

Dosis.

Von 6—14 Gr. entweder mit Fenchelsaamen, oder mit Zucker in Pulver.

Formel.

Rec. Acid. benzoic.
Gr. jv.

Sacchar. lact.
℈j.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Acidum muriaticum.

(Spiritus salis acidus).

(Kochsalzsäure).

Dosis.

Von 10 Tropfen bis zu einer halben Drachme für sich mit Wasser oder in Julepen und Mixturen.

Formel.

Rec. Acid. muriat.

ʒj.

▽ aromat.

℥iv.

Syrup. ribes.

℥j.

M. D, S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Acidum nitricum.

(Spiritus nitr. acidus).

(Salpetersäure).

Dosis.

Von einer halben bis ganzen Drachme mit 1 ½ — 2 Maas Wasser und etwas Schleimichtem, welche Portion täglich verbraucht wird.

Acidum phosphoricum.

(Phosphorsäure).

Dosis.

Von fünf bis zehen Gran in Elixiren, Julepen und Mixturen.

Formel.

Rec. Acid. phosphor.

ʒij.

▽ cinnamomi

℥ij.

Syrup. opiat.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden zwey Theelöffel voll zu nehmen.

Acidum succinicum.

(Sal succini).

(Bernsteinsäure.).

Dosis.

Von 2—10 Gr. mit Zucker abgerieben in Pulver.

Formel.

Rec. Acid. succin.

Gr. iij.

Sacchar. alb.
℈j.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. VI.
D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Acidum sulphuric. concentratum.

(Oleum Vitrioli).
(Conzentrirte Schwefelsäure).

Dosis.

Mit Wasser sehr verdünnt blos äusserlich zu gebrauchen.

Acidum sulphuricum dilutum.

(Spiritus Vitrioli).
(Verdünnte Schwefelsäure).

Dosis.

Von 10—50 Tropfen in Julepen, Elixiren, Mixturen. Man vergesse indeß bei der Verordnung niemals den Beinamen: dilutum.

Formel.

Rec. Acid. sulphuric. dilut.
℥ij.
▽ rub. id.
℥iv.

Tinct. Op. simpl. ℈j.

Syrup. opiat. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Acidum tartaricum.

(Acidum tartari essentiale).

(Weinsteinsäure.).

Dosis.

Von vier Gr. bis zu einem Scrupel in Pulver und Auflösung.

Formel.

Rec. Acid. tartar. ℈ß.

Sacchar. alb. ℈i.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Acid. tartar. ℨj.

▽ rub. id.

℥iij.

Syrup. rub. id.

℥j.

M. D. S.

Stündlich zwey Eßlöffel voll zu nehmen.

Aether aceticus.

(Naphta aceti).

(Essigäther).

Dosis.

Von 10—30 Tropfen entweder für sich oder in Mixturen.

Formel.

Rec. Rad. Valer. minor.

℥ij.

infund. ▽ fontan. fervid.
suffic. quantit. p. ¼ hor.
Colat. refriger.

℥iiij.

add.

Aether. acet.

ʒj.

Syrup. cinnamom.

℥j.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Aether sulphuricus.

(Naphta vitrioli).

(Schwefeläther).

Dosis.

Von 5—10 Tropfen, entweder alleine oder in Verbindung mit andern geistigen Mitteln.

Formel.

Rec. Aether. sulphur.

ʒj.

Tinct. Op. simpl.

ʒß.

▽ menth. piper. vinos.

℥iv.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. Cortic. peruv. opt.

℥ß.

infund. Vin. rhenan. opt.

℥viij.

stet in Digest. p. quat. hor.

Colat. refriger. add.

Aether. sulphur.

ʒj.

Extr. Chin. frigid. parat.

ʒij.

Syrup. flor. aur.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Alumen. Alaun.

Dosis.

Von 5—15 höchstens 20 Gr.

1) in Pulver,

2) in Pillen,

3) in Auflösungen.

Formel.

Rec. Alum.

Gr. v.

Puriss. Op.

Gr. $\frac{1}{4}$.

Sacchar. lact.

℈j.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver in Chamillenthee zu nehmen.

Formel.

Rec. Alum.

ʒj.

Extr. Cortic. Cascar.
ʒij.
fiant pilul. ponder.
Gr. ij.
Conspergant. ℥ cortic. cinnam.
q. s.
D. S.

Alle 5 Stunden 6 Stück zu nehmen.

Formel.

Rec. Aqu. cinnam. spirit.
℥iv.
Extr. gentian. rubr.
ʒij.
Alum.
ʒj.
Syrup. cort. aur.
℥ß.
M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Ammoniacum depuratum.

(Gereinigtes Ammoniak).

Dosis.

Von 5—15 bis zu 30 Gr.

1) in Emulsionen,

2) Latwergen,

3) Auflösungen,
4) in Pillen.

Formel.

Rec. G. Ammon. depur.
— arab. —
aa. ℥iij.
Ter. c. vitell. ov. suffic. quantit.
s. terend. add.
▽ foenic.
℥iv.
Liquor. Ammon. anis.
℥ß.
Syrup. Seneg.
℥j.
M. D. S.
Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. G. Ammon. depur.
℥iij.
Syrup. cortic. aur.
q. s. ut fiat electuarium.
D. S.
Stündlich 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Gumm. ammon. depur.
℥ij.

solv. in
infus. flor. Samb.
℥iij.
add.
Liquor. ammon. acet.
℥j.
Syrup. opiat.
℥ß.
M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. G. ammon. dep.
Extr. taraxac.
Sapon. med. aa.
ʒj.
As. foetid.
Al. aa.
ʒß.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
D. in scutula.
S.

Früh und Abends 10 Stücke zu nehmen.

Asa foetida depurata.

(Gereinigter stinkender Asand).

(Gummi asa foetid).

(Teufelsdreck).

Dosis.

Von 5—20 und mehrern Granen.

1) in Pillen,

2) in Auflösung von Eigelb, oder in aromatischen Wässern.

Formel.

Rec. As. foetid.
Extr. Myrrh. aquos.
a a. ℨj.
fiant pilul. N. 60.
Conspergant. ℥. cortic. cinnamom. q. s.
D. in scatula

S.

Früh und Abends 6 Stück zu nehmen.

Formel.

Rec. As. foetid.
ℨij.
Ter. c. vitell. ovor. suffic. quantit.
s. terendo add.

▽ foenicul.
℥iv.
Liquor. Ammon. anisat.
℥ß.
Syrup. gumm. ammon.
℥j.
M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. As. foetid.
℥iij.
solv. in
▽ flor. chamom.
℥iii.
add.
Tinct. Op. simpl.
ʒß.
Oxym. scill.
℥j.
M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Galbanum depuratum.

(Mutterharz).

(Gummi galbanum).

Dosis.

Von 10—40 Gr.

1) in Pillen,
2) in Auflösung mit andern auflösenden Mitteln.

Formel.

Rec. Galban. depur.
ʒj.
Extr. Myrrh. aquos.
ʒß.
Op. aquos.
℈j.
m. fiant pilul. N. ~~66.~~ 56
Dentur in scatula.
S.
Alle 5 Stunden 6 Stück zu nehmen.

Formel.

Rec. Galban. depur.
ʒiij.
As. foetid.
ʒij.
Ter. c. vit. ovor.
N. IV.
Sub terend. add.
▽ Menth. piper.
℥v.
Tinct. aromat.
ʒij.

Elixir. c. Succ. Liquir.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Galban. depur.

℥ß.

solv. in

▽ flor. aurant.

℥iv.

add.

Liquor. ammon. acet.

Syrup. Seneg.

āā. ℥j.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Sagapenum depuratum.

(Sagapengummi).

Dosis.

Die Dosis ist eben die, wie beim Ammoniakgummi und wie bei der asa foetida, daher wir auf diese verweisen.

Ammonium carbonicum.

(Alcali volatile siccum).

(Kohlensaures Ammonium).

Dosis.

Von einem bis 4 Gr. in wässerigter Auflösung.

Formel.

Rec. Ammon. carbon. ʒj.
solv. in
▽ flor. aur. ℥iiij.
add.
Syrup. cinnamom. ℥j.
M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Ammonium carbonicum pyro oleosum.

(Sal volatile cornu cervi).

(Kohlensaures Ammonium mit brenzlichtem Oehle).

Dosis.

Von 2—10 Gr. in flüssiger Gestalt.

Formel.

Rec. Rad. Valer. minor. ℥iij.

infund. ▽ fontan. fervid.
suffic. quantit. Colat. refriger.
℥iv.
add.
Ammon. carbon. pyr. oleos.
ʒj.
Aeth. sulphur.
ʒß.
Syrup. flor. aur.
℥j.
M. D. S.
Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Ammon. carbon. pyr. oleos.
℈ß.
Aether. acet.
ʒjß.
M. D. S.
Alle halbe Stunden 15 Tropfen zu nehmen.

Ammonium muriaticum depurat.

(Sal ammoniacum depuratum).
(Gereinigtes salzsaures Ammonium).

Dosis.

Von 5—20 Gr. bis zu 2 Scrupel in wässerigter Auflösung.

Formel.

Rec. Ammon. muriat. depur.

ʒiij.

solv. in

▽ rub. id.

℥iij.

add.

Syrup. emuls.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Ammonium muriaticum martiatum
(Flores salis ammoniaci martiales).
(Eisenhaltiges salzsaures Ammonium).

Dosis.

Von 3—10 Gr.

1) in Pulver.

2) in geistiger Auflösung.

Formel.

Rec. Pulver. Cortic. peruv. opt.

℈j.

flaved. cortic. aur.

℈ß.

ammon. muriat. martiat.

Gr. iv.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Ammon. muriat. martiat. ℈j.

Aether. sulphuric. ʒij.

▽ cinnamom. vinos. ℥iv.

Syrup. cydon. ℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Aqua aromatica.

(Aqua cephalica, aqua Embryonum).

(Aromatisches Wasser).

Dosis.

Von einer halben bis ganzen Unze Mixturen beigesezt.

Aqua calcariae ustae.

(Aqua calcis).

(Kalkwasser).

Dosis.

Von 2—4 Unzen mehrmalen des Tags und lange fortgesetzt.

Aqua Cerasorum.

(Kirschwasser).

Dosis.

Von einer halben bis mehrern Unzeu Mixturen beigesetzt.

Aqua chamomillae.

(Chamillenwasser).

Dosis.

Von einer halben bis mehrern Unzen Mixturen zugesetzt.

Aqua Cinnamomi simplex.

(Einfaches Zimmtwasser).

Dosis.

Von einer halben bis einigen Unzen zu Mixturen.

Aqua Cinnamomi vinosa.

(Geistiges Zimmtwasser).

Dosis.

Von einer halben bis ganzen Unze für sich und in Mixturen.

Aqua Cochleariae.

(Löffelkrautwasser).

Dosis.

Wie das vorige.

Aqua destillata simplex.

(Einfaches destillirtes Wasser).

Man braucht es für sich allein fast gar nicht, sondern nur zum Vehikel anderer Arzneien.

Aqua florum Aurantii.

(Aqua Naphae).

(Orangenblüthwasser).

Dosis.

Von einer halben bis mehrern Unzen für sich oder in Mixturen.

Aqua florum Sambuci.

(Hollunderwasser).

Dosis.

Von einer halben bis mehrern Unzen zu Mixturen gemischt.

Aqua florum Tiliae.

(Lindenblütwasser).

Dosis.

Von einer halben bis mehrern Unzen in Mixturen.

Aqua foeniculi.

(Fenchelwasser).

Dosis.

Von einer halben bis mehrern Unzen in Mixturen.

Aqua hyssopi.

(Ysopwasser).

Eben so wie das vorige.

Aqua Laurocerasi.

(Kirschlorbeerwasser).

Dosis.

Von 10—20 Tropfen allein oder in Elixiren.

Formel.

Rec. Tinct. Op. simpl.
Aeth. sulphur.
a a. ℥ß.
▽ Lauroceras. ℥ß.
M. D. S.

Täglich dreymal 20 Tropfen zu nehmen.

Aqua melissae.

(Melissenwasser).

Dosis.

Zu einer halben bis mehrern Unzen in Mixturen.

Aqua menthae crispae.

(Krausemünzwasser).

Dosis.

Von einer halben bis zwey Unzen in Mixturen.

Aqua menthae piperitae.

(Pfeffermünzwasser).

Dosis.

Von einer halben bis mehrern Unzen für sich oder in Mixturen.

Aqua menthae piperitae vinosa.

(Geistiges Pfeffermünzwasser).

Dosis.

Von einer halben bis ganzen Unze in Mixturen.

Aqua petroselini.

Dosis.

Zu mehrern Unzen.

Aqua rosarum.

Dosis.

Desgleichen.

Aqua rubi idaei.

Dosis.

Desgleichen.

Aqua Rutae.

(Rautenwasser).

Dosis.

Von einer halben bis 2 Unzen in Mixturen.

Aqua Salviae.

(Salbeywasser).

Dosis.

Eben so wie das vorhingenannte.

Aqua saturnina.

(Aqua vegeto mineralis Goulardi).

Blos äusserlich anwendbar und zwar immer mäßig lauwarm.

Aqua sulphurato acidula.

(Liquor probatorius Hahnemanni).

(Säuerliches Schwefelwasser).

Blos anwendbar zur Entdeckung fremder Substanzen z. E. Metalle in wässerigen oder geistigen Flüssigkeiten.

Aqua vulneraria vinosa.

(Weinigtes Wundwasser).

Nur äusserlich anwendbar.

Argentum nitricum fusum.

(Lapis infernalis).

(Höllenstein).

Dosis.

Nur äusserlich anwendbar.

Baryta muriatica.

(Terra ponderosa salita).

(Salzsaure Schwererde).

Dosis.

Man löst eine Drachme in einer Unze destillirtem Wasser auf und von dieser Auflösung werden Erwachsenen alle 2—3 Stunden 30—40 Tropfen gegeben.

Formel.

Rec. Terra ponderos. salit. Baryt. muriat. ʒj.

solv. in

▽ comm. destill. ℥j.

add.

Syrup. cort. aurant. ℥ß.

M. D. S.

Alle 3 Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Bismuthum oxydatum album.

(Magisterium bismuthi).

(Weisses Wismuthoxyd).

Dosis.

Von einem bis vier Gr. in Pulver, auch in Pillen.

Formel.

Rec. Bismuth. oxydat. alb. Gr. j.
Puriss. op. Gr. ¼.
flaved. cort. aur. ℈ß.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. vi.
D. S.

Tags 3mal ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Bismuth. oxydat. alb. ℈ß
Mucilag. gumm. arab. q. s.
vt fiant pilul. N. xx.
D. S.

Alle 3 Stunden 2 Pillen zu nehmen.

Calcaria muriatica.

(Sal ammoniacum fixum).

(Salzsaure Kalkerde).

Ist nicht mehr anwendbar.

Calcaria sulphurata.

(Hepar sulphuris calcareum).

(Schwefelkalkerde).

Blos äusserlich zu gebrauchen z. E. zu Bädern, wo man auf ein Bad ohngefehr eine Unze Schwefelkalkerde nimmt.

Calcaria sulphurato - stibiata.

(Calx antimonii cum sulphure).

(Schwefelkalkerde mit Spiesglanz).

Dosis.

Von 2—6 Gr.

1) in Pulver,
2) in Pillen,
3) in Auflösung.

Formel.

Rec. Calcar. sulphurat. stibiat.
Gr. ij.
Puriss. op.
Gr. ¼
Sacchar. alb.
℈j.

m. f. ℨ.
Dispensent. tal. Dos. N. VIIII.
D. S.
3mal im Tage ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Calcar. sulphurat. stib.
ʒß.
Mucilag. gumm.
Tragacanth.
ʒj.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
D. in scat.
S.
Alle 3 Stunden 2 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Calcar. sulphur. stibiat.
ʒß.
Coqu. in vas. figul.
bene claus. c.
▽ fontan. Libr.
ij.
ad colat. Libr.
j.
D. S.
Antimonial-Schwefelwasser.

Hufeland

Carbo purus.

(Reine Kohle).

Blos äusserlich anzuwenden z. E. zu einem Zahnpulver mit China.

Formel.

Rec. Cortic. chin. opt.

℥ij.

Carbon. pur.

℥vi.

m. f. ℥.

D. S.

Zahnpulver.

Carbo spongiae.

(Spongiae ustae).

(Schwammkohle).

Auch nur äusserlich anwendbar.

Ceratum aeruginis.

(Cera viridis).

(Grünspancerat).

Nur äusserlich anwendbar.

Formel.

Rec. Cerat. aerug.

℥j.

D. S.

Zum bewußten Gebrauch.

Ceratum Resinae Pini.

(Ceratum citrinum).

(Harzcerat).

Eben so anwendbar.

Cereoli saturnini.

(Cereoli mitigantes).

(Bleibougies).

Ihre Anwendungsart ist eben auch nur äusserlich z. E. bei geringen Entzündungen der Harnröhre.

Cereoli simplices.

(Cereoli exploratorii).

(Einfache Bougies).

Eben auch nur äusserlich allenfalls bei gestopften Trippern.

Cinnabaris.

Ist als Heilmittel nicht mehr zu gebrauchen. Blos zu Räucherungen könnte er dienen.

Colocynthis praeparata.

(Trochisci Alhandal).

(Koloquinthen).

Dosis.

Man muß eine doppelte Wirkung von den Koloquinthen unterscheiden,

1) als Reizmittel,
Dosis: zu ⅛ Gr.
2) als Purgiermittel,
Dosis: zu einigen Granen.
Man verschreibt sie im Decoct.

Formel.

Rec. Colocynthidum pulverisatar. ℨij.
Coqu. c. cerevis. libr. ij.
ad libram unam
Cola.
D. S.
Täglich 3mal einen Eßlöffel voll.

Hufeland.

Conserva cochleariae.
(Löffelkrautconserve).

Dosis.

In Wasser aufgelößt zu einer beliebigen Menge genommen.

Rec. Conserv. cochlear. ℥j.
solv. in
▽ foenic.
menth. piper. a͞a. ℥iij.

add.

Syrup. cortic. aur.

℥j.

M. D. S.

Alle Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Conserva rosarum.

(Rosenconserve).

Dosis.

Eben so wie die vorhin erwähnte.

Formel.

Rec. Pulver. Cortic. Cascar.

℥ß.

coqu. c. ▽ fontan.

℥viii.

ad reman.

℥iv.

Colat. add.

Conserv. rosar.

℥ß.

Syrup. flor. aur.

℥iij.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Cuprum ammoniatum.
(Kupfer mit Ammonium).

Dosis.

Von $\frac{1}{8}$—5 Gr.
a) in Pulver,
b) in Pillen.

Formel.

Rec. Cupr. ammon.
Gr. $\frac{1}{4}$.
flaved. cortic. aur.
Sacchar. alb. $\overline{aa}$.
℈ß.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos.
N. VIIII.
D. S.
3mal des Tags ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Cupr. ammon.
Gr. XVI.
Micae panis alb.
℈iv.
Liquor. ammon. carbon. q. s.
ut fiat massa ex qua formentur pilulae N. XXXII.
D. S.
Früh und Abends 1 Stück zu nehmen.

Cuprum sulphuricum.

(Vitriolum de Cypro).

(Schwefelsaures Kupfer).

Dosis.

Von 2—10—15 Gr. und zwar in Auflösung.

Formel.

Rec. Cupr. sulphuric. Gr. iv.
solv. in
▽ fontan. ℥iij.
add.
Syrup. Cerasor. ℥ß.
M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Elaeosaccharum Anisi.

(Anisöhlzucker).

Dosis.

Wird zu einer beliebigen Menge in Thee genossen oder auf Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Aqu. menth. piper. vinos. ~~flor.~~
Flor. chamom.
āā. ℥iij.

Tinct. Chin. compos. ℥ß.

Cortic. aur. ℥iij.

Elaeosacchar. anis. ℥ij.

Eine Stunde vor der Mittagsmahlzeit und eine Stunde nach derselben einen Eßlöffel voll mit Wein zu nehmen.

Elaeosaccharum Cinnamomi.

(Zimmtöhl).

Dosis.

Ist wegen seines hohen Preißes nur zu einigen kleinen Gaben anzuwenden, wo man es auf Mixturen beisetzen kann um sie wohlschmeckender zu machen.

Formel.

Rec. Rad. Valer. minor. serpentar. Serpentar. virg.

aa. ℥ij.

insund ▽ fontan. fervid. suffic. quantit.

Colat. ℥iv.

add.

Tinct. Op. simpl. ℈j.

Elaeosacchar. cinnamom.

℥j.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Elaeosaccharum flavedinis citri.

(Zitronenschalenzucker).

Dosis.

Unzenweise Mixturen beigesetzt, oder auf Pulvern um ihren Geschmack zu verbessern.

Formel.

Rec. Elaeosacchar. citr.

℥j.

Extr. Myrrh. aquos.

ʒß.

Op. aquos.

Gr. ij.

Sulphur. stibiat. aurant.

Gr. iv.

m. f. ℥.

D. in scatula.

S.

Alle 2 Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Elaeosaccharum foeniculi.

(Fenchelöhlzucker)

und

Elaeosaccharum menthae piperit.

Pfeffermünzöhlzucker können beide wie der erst angegebene gebraucht werden, nur mit dem Unterschiede, daß man diese beide letztgenannten reichlicher geben kann, indem sie nicht zu theuer sind.

Electuarium aromaticum.

(Electuarium stomachicum).

(Gewürzlatwerge).

Dosis.

Theelöffelweise.

Formel.

Rec. Electuar. aromat. ℥jß.

D. S.

Alle 2 Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Electuarium e Senna.

(Electuarium lenitivi).

(Sennalatwerge).

Dosis.

Kindern Theelöffel- Erwachsenen Eßlöffelweise.

Electuarium Theriaca.

(Theriaklatwerge).

Dosis.

Von 2—3 Drachmen. Auch äusserlich wendet man sie nach beliebigem Gebrauch auf den Unterleib an.

Elixir aurantiorum compositum.

(Elixir viscerale).

(Pomeranzenelixir).

Dosis.

Von 60—80 Tropfen.

Formel.

Rec. Elixir. aurant. compos.

℥j.

Tinct. Op. simpl.

℈j.

M. D. S.

Alle 3 Stunden 80 Tropfen mit etwas Wein zu nehmen.

Elixir ex Succo Liquiritiae.

(Elixir pectorale).

(Süßholzelixir).

Dosis.

Von 1—2 Drachmen täglich 5—6mal.

Formel.

Rec. Elixir. c. succ. Liquir. ℥j.

D. S.

Brustsaft davon alle 2 Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Rad. Seneg. ℥ß.

Coqu. c. ▽ fontan. ℥viii.

ad remanent. ℥iv.

Colat. add.

Elixir. c. Sncc. Liquir. ℥j.

Syrup. Seneg. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Absynthii.

(Wermuthextract).

Dosis.

Von fünf Gran bis zu einer Drachme,

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Absynth.

℥ß.

solv. in

▽ menth. piper.

℥iv.

add.

Tinct. cortic. aur.

℥iij.

Syrup. d. Alth.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Absynth.

℥iij.

Chin.

℥j.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

Conspergant. ℥ cortic. cinnamom. q. s.

D. in scatula.

S.

Früh und Abends 12—15 Stücke zu nehmen.

Extractum Cardui benedicti.

(Kardebenedictenextract).

Dosis.

Von zehen Gran bis zu einer Drachme.

1) in Mixturen,
2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. card. benedict.
℥iij.
solv. in
▽ cinnamom. s. v.
℥iij.
add.
Tinct. Op. simpl.
℈j.
Syrup. flor. aurant.
℥j.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. card. benedict.
ʒij.
Cort. Cascar.
ʒiij.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.

Conspergant. ℥ cort. cinnamom. q. s.

D. in scatula.

S.

Alle 3 Stunden 8—10 Stücke zu nehmen.

Extractum cascarillae.

(Kaskarillenextract).

Dosis.

Von 10 Gran bis zu einer Drachme.

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Cascarill. ʒß.

solv. in

▽ flor. aur. ℥iv.

add.

Spirit. sulphuric. aeth. ʒj.

Syrup. cort. aur. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Cascar.

℥ß.

forment. pilul. ponder.

Gr. ij.

Conspergant. pollin. Lycopod.

q. s.

D. S.

Täglich 2mal 10 Stücke zu nehmen.

Extractum centaurii minoris.

(Tausengüldenkrautextract).

Dosis.

Von 10 Gran bis zu 1 Drachme.

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. centaur. minor.

ʒiij.

solv. in

▽ Chaerefol.

℥iv.

add.

Tinct. Cascar.

ʒij.

Syrup. foenic.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rcc. Extr. centaur. minor.
℥ij.
Myrrh.
℥ß.
m. f. pilul. ponder.
Gr. j.
D. S.
Alle 3 Stunden 6 Stücke zu nehmen.

Extractum chamomillae vulgaris.
(Kamillenextract).

Dosis.

Von 10 Gran bis zu 1 Drachme.
1) in Mixturen,
2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. chamom.
℥ß.
taraxac.
gram.
a͞a. ℥ij.
solv. in
▽ flor. chamom.
℥viij.
add.
Elaeosacchar. foenic.
℥ß.

Syrup. flor. aur.

ʒvi.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. chamom.

ʒiij.

taraxac.

ʒiß.

formentur pilul. ponder.
granor duor.

D. S.

Alle 2 Stunden 6 Stücke zu nehmen.

Extractum Chinae aquosum.

(Wässerigtes Chinaextract).

Dosis.

Von 1 Scrupel, bis zu 2 Drachmen täglich

1) in Auflösung von Wein,

2) in Pillen mit andern stärkenden Extracten.

Formel.

Rec. Extract. chin. aquos.

℥ß.

solv. in
Vin. rhen. optim.

℥iv.

add.
Tinct. aromat. ℥ij.
Syrup. cinnamom. ℥j.
M. D. S.
Tags 3mal 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extract. chin. aquos. ℥iij.
Absynth. ℥jß.
m. f. pilul. ponder. Gr. ij.
Conspergant. ℥ cort. cinnamom. q. s.
D. S.
Tags 3mal 12 Stücke zu nehmen.

Extractum Dulcamarae.
(Bittersüßextract).

Dosis.

Von 5—10 Gr.
1) in Mixturen,
2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Dulcamar. ℈j.

solv. in
▽ cinnamom. spirit.
℥j.
add.
Tinct. Op. simpl.
℈j.
Syrup. d. Alth.
℥j.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Dulcamar.
ʒß.
forment. pilul. ponder.
Gr. ij.
Conspergant. ʒ cortic. peruvian. q. s.
D. S.

Früh und Abends 3 Stücke zu nehmen.

Extractum fumariae.

(Erdrauchextract).

Dosis.

Von 5 Gran bis zu einer Drachme.

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. fumar.

℥ß.

solv. in

▽ flor. aur.

℥iv.

add.

Tinct. Cascar.

ʒij.

Syrup. opiat.

℥ß.

M. D. S.

Tags 3mal 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. fumar.

ʒij.

Chin. aquos.

ʒj.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

Conspergant. ♄ flor. Cass. q. s.

D. S.

Alle 3 Stunden 8 Stücke zu nehmen.

Extractum gentianae.

(Enzianextract).

Dosis.

Von 10 Gran bis zu 1 Drachme.

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. gentian.
ʒij.
solv. in
▽ cinnamom. vinos.
℥iv.
add.
Tinct. cortic. aur.
ʒiij.
Syrup. cortic. aur.
℥ß.

M. D. S.

Eine Stunde vor dem Mittagsessen und eine Stunde nach demselben 1 Eßlöffel voll mit Wein zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. gentian.
ʒij.
Cascar.
ʒj.
Cortic. Hippocastan.
ʒij.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

Conspergant. ℥ cortic. peruvian. q. s.

D. S.

Tags 3mal 15 Stücke zu nehmen.

Extractum Ligni Campechiensis.

(Campecheholzextract).

Dosis.

Von 5 Gran bis zu einer Drachme.

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Lign. Campechiens.

ʒß.

solv. in

▽ aromat.

℥iv.

add.

Mucilag. gumm. arab.

ʒß.

Syrup. emuls.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Lign. Campechiens.

℥iij.

Quass.

ʒj.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

Conspergant. ℥ rad. Liquir.

q. s.

D. S.

Alle 2 Stunden 8 Stücke zu nehmen.

Extractum Marrubii.

(Andornextract).

Dosis.

Von 1 Scrupel bis zu mehreren Drachmen.

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Marrub.

℥ß.

solv. in

▽ flor. chamom.

℥jv.

add.

Mell. despumat.

Syrup. d. Alth.

a a. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Marrub.

℥ij.

As. foetid.

℥j.

Extract. Myrrh. aquos.

℥ß.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

Conspergant. ♄ flor. Cass.

q. s.

D. S.

Früh und Abends 10 Stücke zu nehmen.

Extractum Millefolii.

(Schaafgarbenextract).

Dosis.

Von 5 Gran bis zu 1 Drachme.

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Millefol.

℥iij.

solv. in
▽ aromat. ℥iij.
add.
Tinct. Op. simpl. ℈j.
Syrup. foenic. ℥j.
M. D. S.
Alle 3 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Millefol. ℥j.
ferri pulverat. ʒij.
m. f. cum pulver.
Cinnamom. pilul. ponder. Gr. iij.
D. S.
Täglich 3mal 4 Stück.

Quarin.

Extractum Rhei.

(Extractum rhabarbari).

(Rhabarberextract).

Dosis.

Von 10—15 Gr.

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Rhei

ʒj.

solv. in

Tinct. rh. aquos.

℥j.

M. D. S.

Stündlich 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. rh.

Cascar.

cort. peruv.

Limat. ferri

āa. ʒj.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

D. S.

10—15 Stücke auf einmal zu nehmen.

Jahn.

Extractum Salicis Laureae.

(Lorbeerweidenextract).

Dosis.

Von einem halben Scrupel bis zu einer halben Drachme.

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Salic. Laur.

℥ß.

solv. in

▽ aromat.

℥iv.

add.

Tinct. aromat.

ʒij.

Syrup. flor. aurant.

℥i.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Salic. Laur.

ʒiij.

Sapon.

ʒij.

taraxac.

ʒiß.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

D. S.

Früh und Abends 10 Stücke zu nehmen.

Extractum Trifolii aquatici.
(Bitterkleeextract).

Dosis.

Von einem halben bis ganzen Scrupel.

1) in Mixturen,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. trifol. ʒiij.
gram. ʒiß.
solv. in
▽ flor. chamom. ℥vi.
add.
Tinct. Chin. compos. ℥ß.
Syrup. flor. chamom. ʒvi.
M. D. S.

Stündlich einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. trifol. ʒij.
Sapon. ʒj.

As. foetid.

℈j.

m. f. pilul. ponder.

Gr. j.

Conspergant. ℥ rad. Liquir.
q. s.

D. S.

Alle 3 Stunden 10 Stücke zu nehmen.

Extractum Aconiti.

(Eisenhütleinextract).

Dosis.

Von einem halben Gran bis zu einem Scrupel.

1) in Pulver,

2) in Pillen,

3) in Auflösungen.

Formel.

Rec. Extr. acon.

Gr. ½.

Sacchar. lact.

℈ß.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Alle 3 Stunden ein solches Pulver in Chamillenthee zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. acon. ℨß.

Hydrargyr. mur. mit. ℈j.

Sapon. guajac. ℨi.

m. f. pilul. N. 55.

D. S.

Früh und Abends 1 Stück zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. acon. ℈j.

solv. in

vin. stib. ℨß.

add.

Tinct. Op. simpl. ℈ß.

M. D. S.

Früh und Abends 10 Tropfen zu nehmen.

Extractum herbae Belladonnae.

(Belladonnaextract).

Dosis.

Von einem halben bis zu 5 Gran.

1) in Pulver,

2) in Pillen,
3) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. Belladonn.
Gr. ½.
flavedin. cortic. aur.
℈ß.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. IV.
D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Belladonn.
℈j.
fiant pilul. ponder.
Gr. j.
D. S.

Früh und Abends eine solche Pille zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Belladonn.
Gr. jß.
solv. in
▽ Lauroceras.
℥iß.

add.

Tinct. Op. simpl.

℈ß.

M. D. S.

3mal am Tage 15 Tropfen zu nehmen.

Extractum Conii maculati.

(Extractum cicutae).

(Schierlingsextract).

Dosis.

Von einem halben bis zu 5 Gran

1) in Pulver,

2) in Pillen,

3) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. Conii macul.

℈j.

Sacchar. alb.

ʒß.

m. f. ℥.

divid. in decem part. aequal.

D. S.

Tags 3mal ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Extract. con. macul.

As. foetid.

a̅a. ʒj.

Sapon. hispan.
℥ß.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
Täglich 3mal 6 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Cicut.
℥j.
Kal. tartar.
ℨiij.
Extr. Sapon.
ℨij.
solv. in
▽ fontan.
℥vi.
add.
Syrup. opiat.
℥ß.
M. D. S.
Alle 2 Stunden ½ Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Hyoscyami.
(Hyoszyamusextract).

Dosis.

Von einem halben bis zu 2 Gran,
1) in Pulver,
2) in Pillen,
3) in Auflösung.

Formel.

Rec. Extr. Hyoscyam.
Gr. ½.
Puriss. op.
Gr. ¼.
Rad. ipecacuanh.
Gr. ½.
Sacchar. alb.
℈ß.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. xviii
D. S.

3mal des Tags ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Hyoscyam.
ʒß.
Mosch. opt.
℈ij.
m. f. pilul. ponder.
Gr. j.
D. S.

Tags 3mal 2 Stücke zu nehmen. (Blos bei reichen Personen anwendbar).

Formel.

Rec. Extr. Hyoscyam.
℈j.
solv. in

▽ cinnamom. spirit. ℥ij.

add.

Tinct. Valer. aeth. ʒß.

Syrup. cinnamom. ℥ß.

M. D. S.

Stündlich 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Extractum Aloes.

(Aloeextract).

Dosis.

Von 3—15 Gran,

1) in Pillen,

2) Auflösung.

Formel.

Rec. Extr. Al.

Gumm. ammon.

āa. ʒj.

m. f. pilul. ponder. Gr. ij.

D. S.

Tags 2mal 3 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Al. ʒß.

solv. in
▽ flor. chamom. ℥ij.
add.
Tinct. rh. aquos. ℥j.
Syrup. comm. ℥ß.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Myrrhae.
(Myrrhenextract).

Dosis.

Von 10—20 Gr.
1) in Pulver,
2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Myrrh. aquos. ℨij.
Elaeosacchar. citr. ℥j.
m. f. ℥.
D. S.
Alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Myrrh. aquos. ℨj.

Extr. Op.
Gr. ij.
Sulphur. stib. aurant.
Gr. iv.
Sacchar. lact.
℥j.
m. f. ℥.
D. S.

Alle 2 Stunden des Tags über 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Myrrh. aquos.
Gumm. galban.
āa. ℥iß.
ferr. pulver.
℈j.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
Conspergant. ℥ flor. Cass.
q. s.
D. S.

Früh und Abends 12 Stücke zu nehmen.

Extractum Opii.

(Opiumsextract).

Dosis.

Von einem halben bis zu 4 Gran,
1) in Pulver,

2) in Auflösung,
3) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Op. aquos.
Hyoscyam.
a a. Gr. ½.
Pulver. rad. ipecacuanh.
Gr. ¼.
Sacchar. lact.
℈ß.
m. f. 🝆.
Dispensent. tal. Dos. N. VI.
D. S.

Alle 3 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Op. aquos.
Gr. VI.
solv. in
▽ flor. aur.
℥iij.
add.
Tinct. aromat.
ʒiij.
Syrup. flor. aur.
℥j.
M. D. S.

3mal des Tages über einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Op. aquos.
℥ß.
Myrrh. aquos.
℥i.
m. f. pilul.
N. 45.
D. S.
Früh und Abends 2 Stücke zu nehmen.

Extractum Angelicae.

(Angelicaextract).

Dosis.

Von einem halben Scrupel bis zu einer halben Drachme,

1) in Pillen,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. Angelic.
Myrrh.
āā ℥ß.
Op.
℈j.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
D. S.
Tags 3mal 4 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Angelic.

℥iß.

solv. in

▽ cinnamom.

℥iij.

add.

Tinct. Op. Eccardt.

℈ß.

Syrup. Cerasor.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Arnicae.

(Arnicaextract).

Dosis.

Von 5—10 bis zu 20 Gran,

1) in Pillen,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. Arnic.

Valer.

aa. ʒß.

Millefol.

ʒj.

m. f. pilul.
N. 60.
D. S.
Alle 3 Stunden 3 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Arnic.
Valer.
aa. ℈j.
solv. in
▽ menth. piper.
℥ij.
add.
Tinct. Valer. aeth.
ʒß.
Syrup. cinnamom.
℥j.
M. D. S.
Stündlich 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Extractum Calami.
(Kalmusextract).

Dosis.

Von 15 Gran bis zu 1 Drachme,
1) in Pillen,
2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. calam.

ʒiij.

Chin.

ʒj.

Puriss. Op.

Gr. viii.

Ol. chamom. dest.

gutt. vi.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

D. S.

Früh und Abends 10 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. calam.

ʒß.

solv. in

▽ flor. aurant.

℥vi.

add.

Tinct. Caryophyll.

ʒij.

Syrup. Cydonior.

℥j.

M. D. S.

Alle 5 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Colocynthidis.
(Koloquinthenextract).

Dosis.

Von 2 bis 4 bis zu 6 Gran.
Als Clystier zu 20 — 30 Gr.
Es wird vorzüglich in Pillen angewendet.

Formel.

Rec. Extr. Colocynth. ℨß.
fiant c. Mucilag.
Gumm. Tragacanth. pilul.
N. 30.
D. S.
Vor Schlafengehen 5 Stücke zu nehmen.

Extractum Columbo.
(Kolumboextract).

Dosis.

Von 5 — 20 Gran,
1) in Pillen,
2) in Auflösungen.

Formel.

Rec. Extr. Columb. ℨj.
Rh. ℨß.

ferr. pulverat.

℈j.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

Conspergant. ℥ radic. Liquir. q. s.

D. S.

3mal des Tags 6 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Columb.

℥ß.

solv. in

▽ Meliss.

℥vi.

add.

Tinct. amar.

℥iij.

Syrup. cydon.

℥j.

M. D. S.

Alle 4 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Corticum Aurantiorum.

(Pomeranzenschaalenextract).

Dosis.

Von 15 Gran bis zu einer Drachme,

1) in Pillen,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. cortic. aur.
ʒij.
Myrrh.
Quass.
aa. ʒß.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
D. S.
Alle 3 Stunden 8 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. cortic. aur.
ʒiij.
solv. in
▽ aromat.
℥iv.
add.
Syrup. flor. aur.
ʒß.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Helenii.

(Extractum enulae).
(Alandextract).

Dosis.

Von 10—30 Gr.

1) in Pillen,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. Helen.

ʒij.

solv. in

▽ foenic.

℥iv.

add.

Liquor. ammon. anis.

ʒiij.

Syrup. foenic.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Helen.

ʒij.

Op.

℈j.

Myrrh. aquos.

ʒiß.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

Conspergant. ℥ rad. Liquir.

q. s.

D. S.

Täglich 3mal 10 Stücke zu nehmen.

Extractum Hellebori nigri.
(Schwarz Niesenwurzextract).

Dosis.

Von 2—8 Gr.

1) in Pulver,

2) in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Hellebor. nigr. ℈j.

Hyoscyam. ℈ß.

Sacchar. lact. ʒß.

m. f. ℥.

Dividat.

in decem partes aequal.

D. S.

Alle 3 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Hellebor. nigr. ʒß.

Gumm. ammon. ℈ij.

m. f. pilul. ponder. Gr. ij.

Conspergant. pollin. Lycopod. q. s.

D. S.

Früh und Abends 8 Stücke zu nehmen.

Extractum Levistici.

(Liebstöckelextract).

Dosis.

Von einer halben bis zu einer ganzen Drachme,

in Auflösung.

Formel.

Rec. Extr. Levist.

℈j.

solv. in

▽ foenicul.

▽ flor. Sambuc.

aa. ℥ij.

add.

Tinct. Carminat. Wed.

℥ß.

Syrup. flor. aurant.

℥vi.

M. D. S.

Alle 3 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Pimpinellae.
(Pimpinellextract).

Dosis.

Man hat sie sonst zu einem Scrupel bis zu einer Drachme angewendet, jetzo aber ist sie entbehrlich geworden.

Extractum Valerianae minoris.
(Baldrianextract).

Dosis.

Von einem halben Scrupel, bis zu einer halben Drachme,

1) in Pillen,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. Valer.
Calam.
aa. ʒjß.
Ol. d. Cedr.
Gtt. iv.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
Conspergant. poll. Lycopod.
q. s.
D. S.
Alle 5 Stunden 8 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Valer.
℥ß.
solv. in
▽ Meliss.
℥iv.
add.
Aether. sulphur.
ʒi.
Syrup. foenic.
℥j.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. rad. Calam.
aromat.
ʒiij.
infund. ▽ fontan. fervid.
suffic. quantit.
Colat.
℥iv.
add.
Extract. Valer. minor.
ʒij.
Tinct. Valerian. aeth.
ʒß.
Syrup. pavaver. rhoead.
℥ß.

M. D. S.

Alle Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Chinae frigid. paratum.

(Durch kalte Infusion bereitetes Chinaextract).

Dosis.

Von 1 Scrupel, bis zu 2 Drachmen täglich

1) in Pillen,

2) in Auflösung mit Wein.

Formel.

Rec. Extr. Chin. frigid. parat.

℥iij.

Myrrh.

℥ij.

Millefol.

℥jß.

Pulver. Cortic. peruv. opt.

℥ß.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

D. S.

Tags 3mal 15 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Chin. frigid. parat.

℥ij.

solv. in

Vin. rhenan. opt. ℥iij.

add.

Syrup. cydon. ℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. Cortic. peruv. opt. ℥j.

Coqu. c. ▽ fontan. ℥xvi.

ad remanent. ℥viij.

sub fine coct. add.

Pulver. rad. Valer. min. ʒij.

Diger. Colat. refriger.

add.

Tinct. Valer. aeth. ʒß.

Extr. Chin. frigid. parat. ʒiij.

Syrup. cinnamom. ℥ß.

M. D. S.

Stündlich 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum ferri pomatum.
(Aepflichtes Eisenextract).

Dosis.

Von 2 — 10 Gr.
1) in Pillen,
2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. ferr. pomat.
calam.
ā a. ℥jß.
Pulver. arom.
℥j.
m. f. pilul. ponder. Gr. ij.
D. S.
Tags 2mal 10 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. ferr. pomat.
℥j.
solv. in
▽ aromat.
℥j.
add.
Tinct. aromat.
℥iß.
M. D. S.
Tags 3mal 30 — 40 Tropfen zu nehmen.

Extractum graminis Liquidum.

(Mellago gramin.)

(Queckenextract).

Dosis.

Von 1 Drachme bis zu 5 Drachmen,

1) in Pillen,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. Gramin.
Gumm. ammon.
aa. ℥ij.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
Conspergant. poll. Lycopod.
q. s.
D. S.
Tags 3mal 12—15 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Gram.
℥ß.
solv. in
▽ rub. id.
℥jv.
add.
Mell. despum.
Syrup. d. Alth.
aa. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Taraxaci Liquidum.

(Mellago taraxaci).

(Flüssiges Löwenzahnextract).

Dosis.

Von 2 Drachmen bis zu einer halben Unze,

1) in Pillen,

2) in Mixturen.

In Pillen wird es eben auf die Art gebraucht, wie das vorhergehende.

Formel zur Mixtur.

Rec. Extr. taraxac.

℥ß.

solv. in

▽ fontan.

℥iv.

add.

Tinct. rh. aquos.

℥j.

Syrup. emuls.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Ligni Guajaci.
(Guajakholzextract).

Dosis.

Man gab es ehemals häufiger wie jetzt, und zwar von einer Drachme bis zu mehrern Drachmen.

Jetzt können wir dasselbe entbehren.

Extractum Quassiae.
(Quassienextract).

Dosis.

Von einem halben Scrupel bis zu einem Scrupel,

1) in Pillen,
2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. Quass. ℥iß.
Gentian. rub. ℥ij.
Pulver. rad. Calam. arom. ℥i.
m. f. pilul. ponder. Gr. ij.
Conspergant. flor. Cass. q. s.
D. S.
Täglich 3mal 15 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Quass.

℥ij.

solv. in

▽ cinnamom. vinos.

℥iij.

adde

Tinct. cortic. aur.

℥iij.

Syrup. flor. aurant.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum nucum juglandis.

(Wallnußextract).

Dosis.

Von einem halben Scrupel bis zu einer halben Drachme,

1) in Pillen,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Extr. nuc. jugland.

As. foetid.

aa. ℥jß.

Ol. petr.

℈j.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

D. S.

Früh und Abends 15 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. nuc. jugland.

℥j.

solv. in

▽ menth. piper.

℥j.

add.

Tinct. As. foetid.

℥ß.

M. D. S.

Alle Stunden 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Extractum Rhei compositum.

(Extractum panchymagogum Crollii).

(Zusammengesetztes Rhabarberextract).

Dosis.

Von 5—10 Gr.

in Pillen.

Formel.

Rec. Extr. Rh. compos.

℈j.

forment. pilul. ponder.

Gr. ij.

Conspergant. ℥ cort. cinnamom. q. s.

D. S.

Abends vor Schlafengehen 2 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Rh. compos.
Hydrargyr. muriat. mit.
ā a. ℈j.
fiant pilul. N. 20.
Conspergant. poll. Lycopod. q. s.

D. S.

6 Stücke zu nehmen.

Fel tauri inspissatum.

(Eingedickte Ochsengalle).

Dosis.

Von 5 Gran bis zu einer Drachme, in Pillen.

Formel.

Rec. Fell. taur. inspissat.
Extract. gentian. rubr.
ā a. ʒij.
As. foetid. ʒi.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

Conspergant. ℥ flor. Cass.

q. s.

D. S.

Früh und Abends 18 Stücke zu nehmen.

Ferrum oxydatum fuscum.

(Crocus martis aperitivus).

(Graues Eisenoxyd).

Dosis.

Von 2 bis zu 4 Gr. (Gegenwärtig aber können wir desselben füglich entbehren).

Ferrum oxydatum nigrum.

(Aethiops martialis).

(Schwarzes gesäuertes Eisen).

Dosis.

Man giebt ihn von 10—20 Gran. (Gegenwärtig können wir ihn auch entbehren).

Ferrum pulveratum.

(Limatura martis praeparata).

(Gepülvertes Eisen).

Dosis.

Von 5 Gran bis zu einer halben Drachme,

1) in Pillen,
2) in Pulver.

Formel.

Rec. ferri pulver.
Extr. Chin.
ā a. ℨj.
Quass.
℈ij.
Pulver. rad. Calam. arom.
ℨß.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
D. S.

Alle 4 Stunden 8 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. ferr. pulver.
℈j.
flaved. cortic. aur.
ℨß.
m. f. 🜄.
Dividat. in iv. part. aequal.
D. S.

Alle 3 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Ferrum sulphuricum crystallisatum.

(Vitriolum martis).
(Krystallisirtes schwefelsaures Eisen).

Dosis.

Von 2—4 Gr. Kindern. Erwachsenen bis zu einer halben Drachme,

1) in Pulver,
2) in Pillen,
3) in Latwerge.

Formel.

Rec. ferrum sulphuric. cryst.
Gr. v.
Pulver. Cortic. peruv. opt.
℈j.
flaved. cortic. aur.
℈ß.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. IVIII
D. S.
Tags 3mal ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Ferr. sulphur. cryst.
Extr. Cascar.
aa. ℨj.

m. f. c. pulver.
flor. Cass. pilul. N. 60.
D. S.
Tags 3mal 3 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. semin. cin.
ʒij.
Pulver. rad. Valer.
ʒj.
Jalapp.
℈ij.
Ferr. sulphur. cryst.
℈ß.
Mell. sinc. q. s.
ut fiat electuarium.
D. S.
Tags 4mal einen Theelöffel voll zu nehmen.

Globuli Tartari martiati.

(Globuli martiales).
(Eisenweinsteinkugeln).

Dosis.

Werden jetzt blos äusserlich angewendet, und zwar zu stärkenden Bädern.

Formel.

Rec. Glob. Tartar.

Mart. N. j.
solv. in
▽ fontan. fervid. ℥viij.

D. S.
Zum äusserlichen Gebrauch.

Hydrargyrum aceticum.
(Mercurius acetatus).
(Essigsaures Quecksilber).

Dosis.

Man gab es ehemals bis zu einem Gran in Pulver und in Pillenform. Vorzüglich machte es einen Bestandtheil der Keyser'schen Pillen aus. (Jetzo gebraucht man es nicht mehr).

Hydrargyrum muriaticum corrosivum.
(Mercurius sublimatus corrosivus).
(Aezendes salzsaures Quecksilber).

Dosis.

Man giebt es von $\frac{1}{16}$ bis zu einem $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Gran nach und nach bis zu einem ganzen Gran,

1) in Auflösung,
2) in Pillen.

Formel.

Rec. Hydrargyr. muriatic. corros. Gr. j.

solv. in

▽ aromat. ℥ij.

add.

Tinct. Op. simpl. ℈ß.

Syrup. flor. aur. ℥ß.

M. D. S.

Früh und Abends 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Hygrargyr. muriat. corros. Gr. ij.

Puriss. Op. Gr. j.

▽ flor. aur. ℥j.

M. D. S.

Früh und Abends 20 Tropfen mit etwas Milch zu nehmen.

Formel.

Rec. Hydrargyr. muriat. corros. Gr. iß.

Puriss. Op.

Gr. iv.

solv. in

▽ dest. suffic. quantitat.

add.

Mic. pan. alb. q. s. ut fiant. pilul. N. xvi.

D. S.

Früh und Abends anfangs 1, nachher 2 Stück zu nehmen.

Formel.

Rec. Hyrargyr. muriat. corros.

Gr. vi.

solv. in

▽ dest. fervid. q. s.

add.

Mic. pan. alb.

Sacchar. alb.

aa. q. s.

vt fiant. pilul.

N. 180.

(30 Pillen enthalten einen Gran Sublimat).

D. S.

Früh und Abends eine Pille zu nehmen.

Hufeland.

Hydrargyrum muriaticum mite.

(Mercurius dulcis Calomelas).

(Mildes salzsaures Quecksilber).

Dosis.

Von einem halben Gran bis zu 2 Gran.

Man muß überhaupt mehrere Wirkungen des mercurii dulcisunterscheiden.

Anders wirkt es in acuten Krankheiten, z. E. in einer Pneumonie, anders gegen manche chronische Uebel.

So muß man es bei Helminthiasis (Wurmsucht) nie unter 3—4 Gran geben.

Selbst Kindern von 3—4 Jahren gebe ich das versüßte Quecksilber bei Würmern zu 3 Gran.

Kinder scheinen überhaupt eine gewisse Ertragungsfähigkeit für das Quecksilber zu haben.

(Man verzeihe mir diese kleine Ausschweifung).

Man giebt das versüßte Quecksilber
1) in Pulver,
2) in Pillen.

Formel.

Rec. Hydrargyr. muriat. mit.
Gr. $\frac{1}{2}$.

Puriss. Op.
Gr. ¼.
Sacchar. lact.
℈ß.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. VI.
D. S.

Alle 3 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

(In Pneumonien).

Formel.

Rec. Hydrargyr. muriat. mit.
Gr. iij.
Gumm. Gutt.
Gr. j.
Pulver. rad. Jalapp.
Sem. Santon.
aa. Gr. IX.
Elaeosacchar. citr.
℈ß.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. II.
D. S.

Einen Tag um den andern Morgens nüchtern ein solches Pulver in Wasser zu geben.
Es muß hiebei noch bemerkt werden, daß das Gefäß worinn die Arznei gegeben wird,

rein ausgespühlt werden muß, weil mercurius dulcis in ▽ fast unauflöslich ist.

Formel.

Rec. Hydrargyr. muriat. mit. ʒi.

Sulphur. stibiat. aur. ℈ij.

Gumm. ammon. ʒiß.

m. f. c. Mucilagin.

Gumm. Tragac. pil. ponder. Gr. ij.

D. S.

Alle 2 Stunden 4 Stücke zu nehmen.

Auch äusserlich wendet man das Hydrargyr. muriatic. mite an.

Formel.

Rec. Hydrargyr. muriat. mit. ʒi.

Unguent. rosat. ʒj.

D. S.

Zum bewußten Gebrauch.

Hydrargyrum muriaticum praecipitatum.

(Mercurius praecipitatus albus).

(Weißer Praecipitat).

Dosis.

Ehemals wandte man dieses Mercurialpräparat von $\frac{1}{4}$—1 Gr. als auflösendes, von 2—4 Gr. als ein Purgiermittel an.

Allein neuerer Zeit kam man mit Recht von diesem Gebrauche zurück und man wendet es jetzt blos äusserlich an.

Formel.

Rec. Hydrargyr. muriat. praecipit. ʒj.

Unguent. pomad. ℥j.

D. S.

Zum äusserlichen Gebrauch.

Hydrargyrum oxydatum rubrum.

(Mercurius praecipitatus ruber).

(Rothes Quecksilberoxyd).

Dosis.

Man hat auch dieses Quecksilberoxyd ehemals innerlich gegeben.

De Vigo gab es innerlich zu 2 Gr.

Auch von diesem innerlichen Gebrauche kam man zurück.

Man wendet es auf folgende Art äusserlich an.

Formel.

Rec. Hydrargyr. oxydat. rubr.
℈j.

Butyr. non. sals.
℥j.

D. S.

Zum äusserlichen Gebrauch.

Hydrargyrum oxydulat. nigrum.

(Mercurius niger solubilis Hahnemanni).

(Schwarzes gesäuertes Quecksilber).

Dosis.

Man fängt mit einem halben Gran an und steigt täglich um einen halben Gran mehr.

Man giebt es

1) in Pulver.

2) in Pillen,

Formel.

Rec. Hydrargyr. oxyd. nigr.
Gr. $\frac{1}{2}$.

Puriss. Op.
Gr. $\frac{1}{4}$.

Pulver. rad. Liquirit.

℈ß.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Hydrargyr. oxydul. nigr.

Gr. XII.

Puriss. Op.

Gr. IV.

Elaeosacchar. citr.

℥j.

m. f. ℥.

D. in scatula.

S.

Anfangs des Tags 2mal einen Theelöffel voll zu nehmen, dann bis auf 3 zu steigen.

Formel.

Rec. Hydrargyr. oxydulat. nigr.

Gr. IV.

Puriss. Op.

Gr. ij.

flaved. cortic. aur.

℥j.

m. f. ℥.

Divid. in VIII part. aequal.

D. S.

Anfangs des Tags 2mal ein solches Pulver zu nehmen, dann alle Tage um eines zu steigen.

Formel.

Rec. Hydrargyr. oxydulat. nigr. Gr. VI.

Extr. Taraxac. ʒß.

m. f. c. pulver. Cortic. cinnamom. pilul.

N. 20.

D. S.

Anfangs früh und Abends ein Stück zu nehmen, dann alle Tage 3mal 1 Stück.

Hydrargyrum phosphoricum.

(Mercurius phosphoratus).

(Phosphorsaures Quecksilber).

Dosis.

Von einem Viertel bis zu einem halben Gran

in Pulver.

Formel.

Rec. Hydrargyr. phosphor. Gr. $\frac{1}{4}$.

Cortic. cinnamom.

Gr. VI.

m. f. ℨ.

Dispensent. tal. Dos.

N. VIIII.

D. S.

Früh und Abends anfangs ein solches Pulver zu nehmen, dann alle Tage um eines zu steigen.

Formel.

Rec. Hydrargyr. phosphor.

Extr. Op. aquos.

aa. Gr. ij.

Elaeosacchar. citr.

ʒj.

m. f. ℨ.

D. in scatula.

S.

Des Tages über alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Hydrargyrum stibiato sulphuratum.

(Aethiops antimonialis).

(Schwefligtes Spießglanzquecksilber).

Dosis.

Von einem Gran bis zu 10 für Erwachsene. in Pulver.

Formel.

Rec. Hydrargyr. stibiat. sulphur.
Gr. ij.

Pulver. rad. Liquir.
℈ß.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Hydrargyr. stib. sulphur.
℈j.

Puriss. Op.
Gr. ij.

rad. Liquir.
ʒj.

Elaeosacchar. foenic.
ʒj.

m. f. ℥.

D. S.

Des Tages über alle 2 Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Hydrargyrum sulphurat. nigrum.

(Aethiops mineralis).

(Schwarzes Schwefelquecksilber).

Dosis.

Von einem Gran bis zu 10 Gran, in Pulver.

Formel.

Rec. Hydrargyr. sulphur. nigr.
Gr. j.
Puriss. Op.
Gr. $\frac{1}{4}$.
Sacchar. lact.
℈j.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. IX.
D. S.

3mal des Tages ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Hydrargyr. sulphur. nigr.
Gr. j.
flaved. cortic. aur.
℈ß.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos.
N. IX.

M. D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver zu nehmen.

Infusum Sennae compositum.

(Aqua laxativa).

(Zusammengesetztes Sennainfusum).

Dosis.

Von 2—3 Unzen.

Formel.

Rec. Infus. Senn. compos. ℥ij.

Pulver. rad. Jalapp. ʒß.

Spirit. sulphuric. aeth. Gtt. viii.

Syrup. Mann. laxat. ℥ß.

M. D. S.

Abführendes Tränkchen, Früh nüchtern auf einmal zu nehmen.

(Für starke Personen).

Formel.

Rec. Infus. Senn. compos. ℥iß.

Pulver. rad. Jalapp. Gr. xvi.

Spirit. sulphuric. aether.
Gtt. vi.
Syrup. Cerasor.
℥ß.
M. D. S.

Abführendes Tränkchen, Früh nüchtern auf einmal zu nehmen.

(Für schwächere Personen).

Kali aceticum.

(Terra foliata tartari).

(Essigsaures Kali).

Dosis.

Von einem Scrupel bis zu einer auch bis zu 2 Drachmen in Mixturen.

Formel.

Rec. Kal. acet.
℥iij.
solv. in
▽ fontan.
℥ij.
add.
Syrup. comm.
℥ß.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Kal. acet.

℥iiß.

Extr. gram.

ʒj.

solv. in

▽ petrosel.

℥iv.

add.

Syrup. rub. id.

℥vi.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Kali carbonicum.

(Alcali vegetabile aeratum, sal tartari).

(Kohlensaures Kali).

Dosis.

Von 5—10 Gr.

Als Gegengift gegen den Sublimat wol bis zu 2 Scrupel.

Formel.

Rec. Kal. carbon.

ʒß.

solv. in

▽ comm. destill.

℥iij.

add.

Syrup. comm.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Ol. Amygdal. dulc. rec. ac frigid. expr.

℥j.

▽ rub. id.

℥vi.

Mucilag. gumm. arab.

q. s. vt f. emuls.

add.

Kal. carbon.

ʒij.

Syrup. cydon.

℥i.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Formel.

Rec. Kal. carbon.

Gr. x.

D. in charta

Rec. Succ. pomor. citr. rec. expr.

℥ß.

D. in vitr.

S.

Beide Theile nämlich das Pulver und dieser Citronensaft, werden mit einander vermischt, und während des Aufbrausens genommen.

Formel.

Rec. Kal. carbon.

℥i.

solv. in

▽ Cerasor.

℥iv.

add.

Succ. citr. q. s.
ad saturationem

add.

Syrup. Violar.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Vogel.

Kali causticum siccum.

(Alcali causticum).

(Trockenes ätzendes Kali).

Dosis.

Ehemals gebrauchte man es von ¼ bis zu ½ Gr. Gegenwärtig wendet man es selten mehr innerlich an, sondern blos äusserlich.

Formel.

Rec. Kal. caustic. sicc.
Gr. iij.
solv. in
▽ rosar.
℥vi.
M. D. S.
Zum bewußten Gebrauch.

Kali citratum.

(Sal absinthii citratum).

(Zitronensaures Kali).

Dosis.

Von 10—30 Gran, bis zu einigen Drachmen.

Da es eben so wie das vorhingenannte Kali carbonicum gebraucht wird, wo ich mehrere Formeln angab, so verweise ich auf jenes zurück.

Kali nitricum.

(Nitrum depuratum).

(Salpetersaures Kali). (Salpeter).

Dosis.

Von 15 Gran bis zu einer halben, bis zu einer ganzen Drachme,

1) in Pulver,

2) in Mixtur,

3) in Emulsion.

Formel.

Rec. Kal. nitr. depur.

Gr. xv.

Puriss. Op.

Gr. ¼.

Sacchar. lact.

℈j.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Kal. nitr. depur.

Gumm. nilot.

a a. ℈ß.

Sacchar. lact.

℈j.

m. f. ℈.
Dispensent. tal. Dos. N. IV.
D. S.
Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Kal. nitr. depur.
℥iij.
solv. in
▽ rub. id.
℥vi.
add.
Oxym simpl.
Syrup. rub. id.
āa. ℥j.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Kal. nitr. depur.
Natr. sulphuric. crystallis.
āa. ℥ß.
solv. in
▽ rub. id.
℥ix.
add.
Mucilag. gumm. arab.

Syrup. emuls.

$\bar{a}a$. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Amygdalar. dulc. rec. excorticat.

℥j.

fiat c. ▽ rub. id.

℥x.

emuls. Colat.

add.

Kal. nitr. depur.

℥iijß.

Syrup. comm.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 gehäufte Eßlöffel voll zu nehmen.

Kali sulphuratum.

(Hepar sulphuris salinum).

(Schweflichtes Kali).

Dosis.

Von 10—30 Gran innerhalb 24 Stunden.

1) in Pulver,

2) in Mixtur,
3) in Pillen.

Formel.

Rec. Kal. sulphurat. ℈ß.
Elaeosacchar. citr. ℈j.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. VIIII.
D. S.
Tags 3mal ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rce. Kal. sulphurat. ℈ij.
solv. in
▽ flor. aur. ℥iv.
add.
Syrup. comm. ℥ß.
M. D. S.
Stündlich 2 gehäufte Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Kal. sulphurat.
Gumm. guajac
āa. ℥j.

m. f. c. Spirit. Vin. rectificat. pilul. ponder. granor.

ij.

D. S.

Tags 3mal 10 Stücke zu nehmen.

Kali sulphuricum.

(Arcanum duplicatum. Tartarus vitriolatus).

(Schwefelsaures Kali).

Dosis.

Von einem halben Scrupel, bis zu einem Scrupel alle 2 Stunden.

Wenn aber eine Abführung hervorgebracht werden soll, so darf man es bis zu einer halben Unze geben.

Man verordnet es

1) in Pulver,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Kal. sulphuric.

℥iß.

Rad. rh.

℈ij.

Elaeosacchar. citr.

ʒß.

m. f. ℥.

D. S.

Tags 3mal eine Messerspitze voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Kal. sulphur.
℥iij.
solv. in
▽ Meliss.
℥vi.
add.
Elaeosacchar. foenic.
℥ß.
Syrup. Cerasor.
℥vj.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Kali tartaricum.

(Tartarus tartarisatus).
(Weinsteinsaures Kali).

Dosis.

Als ein auflösendes Mittel von einem Scrupel, bis zu einer halben, auch bis zu einer ganzen Drachme.

Als Laxiermittel bis zu einer Unze.

1) in Pulver,
2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Kal. tartar.
℥iß.

Elaeosacchar. citr.
ʒj.
m. f. ℥.
D. S.
Alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Kal. tartar.
℈j.
Tartar. stibiat.
Gr. j.
Sacchar. alb.
ʒß.
m. f. ℥.
D. S.
Früh nüchtern zu nehmen.

Formel.

Rec. Kal. tartar.
ʒiij.
solv. in
▽ rub. id.
ʒij.
add.
Tinct. rh. aquos.
ʒj.
Syrup. comm.
ʒß.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Kal. tartar.
Extr. Taraxac.
ā a. ℥ß.
Gram.
℥ij.
solv. in
▽ Chaerefol.
℥vi.
add.
Mell. despumat.
℥vi.
Syrup. cort. aur.
℥ß.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Lapides Cancrorum citrati.

(Mit Zitronensäure versetzte Krebssteine).

Dosis.

Man wandte sie sonst von einem halben Scrupel, bis zu einer halben Drachme an. Allein gegenwärtig bedürfen wir derselben nicht mehr, weswegen wir jede Formel darüber übergehen.

Linimentum ammoniatum.

(Linimentum volatile).

(Ammoniumliniment).

Dosis.

Wird blos äusserlich gebraucht.

Formel.

Rec. Liniment. ammon. ℥j.

D. S.

Zum Einreiben.

Formel.

Rec. Liniment. ammon. ℥j.

Camphor. ʒj.

Tinct. Op. croc. ℈j.

M. D. S.

Zum Einreiben.

Linimentum saponato camphoratum.

(Balsamum Opodeldoc).

(Kampferliniment).

Dosis.

Ebenfalls blos äusserlich anwendbar.

Formel.

Rec. Liniment. saponat. camphor. ℥ß.

Ol. Cajeput. ʒß.

M. D. S.

Zum Einreiben.

Liquor ammonii aceti.

(Spiritus Mindereri).

(Essigsaurer Ammoniumliquor).

Dosis.

Von einer halben Drachme bis zu einer halben Unze.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. acet. ℥i.

▽ flor. Sambuc. ℥iv.

Succ. Sambuc. inspissat.

Syrup. d. Alth.

āā. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. rad. Seneg. ℥ß.

Coqu. c. ▽ fontan.
℥viij.
ad remanent.
℥iv.
sub fine coct. add.
Pulver. rad. calam. arom.
ʒiij.
Diger.
Colat. refrigerat.
add.
Liquor. ammon. acet.
Syrup. opiat.
aa. ℥ß.
M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. acet.
℥iß.
Aeth. acet.
ʒj.
M. D. S.

Alle halbe Stunden 40 Tropfen zu nehmen.

Liquor ammonii anisatus.

(Spiritus salis ammoniaci anisatus).

(Ammoniumliquor mit Anisöl).

Dosis.

Von 30 — 60 Tropfen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. anisat.
℥ß.
Tinct. Op. simpl.
ʒß.
M. D. S.
Tags 3mal 25 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Lichen. island.
℥j.
Radic. Alth.
℥iij.
Coqu. c. ▽ fontan.
℥xiv.
ad remanent.
℥viii.
Colat. refrigerat.
add.
Liquor. Ammon. anisat.
ʒß.
Syrup. gumm. ammon.
℥j.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 2 gehäufte Eßlöffel voll zu nehmen.

Liquor ammonii carbonici aquosus.

(Spiritus salis ammoniaci aquosus).

(Wäßrigter kohlensaurer Ammoniumliquor).

Dosis.

Von 10—50 Tropfen mit Wasser verdünnt.

Formel.

Rec. Radic. Serpentar. virginian.
Radic. Angelic.
aa. ℨiij.
infund. ▽ fontan.
fervid. suffic. quantit.
Colat.
℥vi.
add.
Liquor. Ammon. carbon.
aquos.
ℨij.
Syrup. cinnamom.
℥ß.
M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Liquor Ammonii caustici.

(Spiritus salis ammoniaci cum Calce).

(Aetzender Ammoniumliquor).

Dosis.

Von 5 bis zu 20 Trofen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. caustic.

℈ij.

▽ menth. piper.

℥vi.

Syrup. flor. aur.

℥ß.

M. D. S.

Alle halbe Stunden 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Liquor Ammonii pyro oleosi.

(Spiritus Cornu cervi rectificatus).

(Brenzligt=öliger Ammoniumliquor).

Dosis.

Von 5 bis 15 bis 30 Tropfen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. pyr. oleos.

℥ij.

Tinct. Op. simpl.

℥ß.

M. D. S.

Früh und Abends 20 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. pyr. oleos.

℥ijß.

▽ cinnamom. vinos.

℥ij.

Syrup. opiat.

℥ß.

D. S.

Stündlich einen Theelöffel voll zu nehmen.

Liquor Ammonii succinici.

(Liquor Cornu cervi succinatus).

(Bernsteinsaurer Ammoniumliquor).

Dosis.

Von 20 bis zu 30 bis zu 100 Tropfen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. succin.

℥iij.

Tinct. Op. simpl.

℈ij.

M. D. S.

Alle 3 Stunden 20 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. succin.

℥ij.

Tinct. Valer. aeth.

ʒj.

Ol. chamom. dest.

℈ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 30 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. flor. Sambuc.
℥j.
infund. ▽ fontan. fervid.
suffic. quantit.
Colat. refrigerat.
℥viii.
add.
Liquor. Ammon. succin.
℥iij.
Syrup. foenic.
℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll davon zu nehmen.

Liquor Ammonii vinosus.

(Spiritus salis ammoniaci vinosus).

(Geistiger Ammoniumliquor).

Dosis.

Von 20 bis 30 bis zu 100 Tropfen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. vinos.
℥ß.

∇ cinnamom. ℥iv.

Tinct. Op. simpl. ℈j.

Syrup. flor. aurant. ℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. vinos. ℥iij.

Tinct. Valer. aeth. ℥j.

M. D. S.

Alle 3 Stunden 30 Tropfen zu nehmen.

Liquor Hydrargyri muriatici corrosivi.

(Loco Aquae phagaedenicae).

(Aetzender salzsaurer Quecksilberliquor).

Dosis.

Blos äusserlich anwendbar.

Formel.

Rec. Liquor. Hydrargyr. muriat. corros. ℥j.

D. S.

Waschwasser.

Liquor Hydrargyri nitrici.

(Mercurius nitrosus).

(Salpeterquecksilberliquor).

Dosis.

Von 2 bis zu 4 Tropfen in einer hinreichenden Menge Wassers verdünnt.

Formel.

Rec. Liquor. Hydrargyr. nitr. ℈j.

D. S.

Früh und Abends 2 Tropfen in einer halben Theetasse destillirten Wassers zu nehmen.

Liquor Kal. acetici.

(Liquor Terrae foliatae tartari).

(Flüssiges Essigkali).

Dosis.

Von einem Scrupel bis zu einer Drachme, bis zu 2 Drachmen täglich 4mal.

Formel.

Rce. Extr. Taraxac.
Gramin.
āā. ℥iij.
solv. in
▽ fontan. ℥vi.

add.

Liquor. Kal. acet.

℥ß.

Syrup. comm.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Gentian. rubr.

℥ß.

solv. in

▽ menth. piper.

℥iv.

add.

Liquor. Kal. acet.

℥ß.

Syrup. Cerasor.

℥vi.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmeu.

Liquor Kali carbonici.

(Oleum Tartari per deliquium).

(Flüssiges kohlensaures Kali).

Dosis.

Man muß hier bei diesem Mittel mehrere Wirkungen unterscheiden. So z. B. bei acu-

ten Zufällen giebt man es von 15 bis zu 30 ja wol sogar bis zu 40 Tropfen.

Bei chronischen Krankheiten hingegen giebt man es in geringerer Gabe allenfalls nur bis zu 15 Tropfen.

Bei Vergiftungen giebt man es am allerstärksten.

Man giebt es hier bis zu 2 Drachmen pro Dosi.

Formel.

Rec. Liquor. Kal. carbon.
℈ij.
Syrup. cinnamom.
℥j.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. Kal. carbon.
℥ß.
▽ menth. piper.
℥iij.
Syrup. flor. aur.
℥vi.
M. D. S.
Stündlich 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Liquor Kali caustici.

(Lixivium causticum).

(Aetzender Kaliliquor).

Dosis.

Man hat ihn ehemals innerlich zu 10 Tropfen als ein Steinauflösendes Mittel empfohlen. Home empfahl ihn besonders. Man kam indeß mit allem Rechte von diesem Gebrauch zurück.

Liquor Myrrhae.

(Myrrhenliquor).

Blos äusserlich anwendbar.

Liquor pyro-tartaricus.

(Spiritus Tartari).

(Brenzligter Weinsteinliquor).

Dosis.

Ehemals gab man diesen Liquor von einem bis zu 2 Scrupel. Allein jetzo kam man von seiner Anwendung zurück.

Liquor Saponis stibiati.

(Sulphur auratum liquidum Tinctura antimonii Jacobi).

(Spießglanzseifenliquor).

Dosis.

Von 6 bis zu 12 Tropfen.

Formel.

Rec. Liquor. Sapon. stibiat. ℨiß.

▽ cinnamom. s. v. ℥iv.

Syrup. cortic. aur. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Liquor stibii muriatici.

(Butyrum Antimonii).

(Salzsaurer Spießglanzliquor).

Ist blos äusserlich anwendbar.

Magnesia Carbonica.

(Magnesia Salis amari).

(Kohlensaure Magnesia).

Dosis.

Von 20 bis zu 30 Gran, wenn sie Säure tilgen soll. Von einer bis zu 4 Drachmen wenn sie Oeffnung herbeiführen soll.

Man giebt sie:

1) in Pulver,

2) in Mixturen,

3) in Julepen.

Formel.

Rec. Magnes. carbon.

Gr. xv.

Sacchar. alb.

℈j.

m. f. ℥.

D. S.

Auf einmal zu nehmen.

Formel.

Rec. Magnes. carbon.

ʒij.

Elaeosacchar. citr.

ʒj.

m. f. ℥.

D. in scatula.

S.

Alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Magnes. carbon.

ʒß.

solv. in

▽ flor. sambuc.

ʒiv.

add.

Kal. tartar.

ʒij.

Syrup. comm. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Magnes. carbon. ʒij.

Aqu. flor. aurant. ℥iiij.

Gumm. nilot. ℈ij.

Sacchar. alb. ʒij.

M. D. S.

Alle Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Magnesia sulphurica.

(Sal amarum).

(Schwefelsaure Magnesia).

Dosis.

Als Digestivmittel von 20 bis zu 30 Gr.

Als Laxiermittel von einer bis zu anderthalb Unzen auf einmal.

Formel.

Rec. Magnes. sulphur. ʒij.

Elaeosacchar. foenic. ℥j.

M. f. pulv.

D. in scat.

S.

Alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Magnes. sulphur.

℥ß.

solv. in

▽ rosar.

℥iv.

add.

Syrup. comm.

℥ß.

M. D. S.

Alle Viertelstunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Magnes. sulphur.

℥vi.

Ol. amygdal. dulc. rec. ac. frigid. expr.

℥ß.

Mann.

℥ij.

solv. in

sufficient. quantitat. vitell. ovor.

add.

Aqu. flor. aurant.

℥iij.

Syrup. Cerasor.

℥ij.

M. D. S.

Alle halbe Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Magnes. sulphur.

℥j.

solv. in

▽ flor. chamom.

℥vi.

add.

Puriss. Op.

Gr. iv.

Ol. lin. rec.

℥iij.

Syrup. paeon.

℥i.

M. D. S.

Alle Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Magnesia usta.

(Gebrannte Magnesia).

Wird jetzo nicht mehr angewendet.

Mel despumatum.

(Geschäumter Honig).

Dosis.

Von einer Unze bis zu 3 Unzen.

1) entweder für sich
2) oder in Mixturen mit Extracten rc.
3) oder Latwergen beigesetzt.

Formel.

Rec. Extr. gentian. rubr.
Extract. Centaur. minor.
aa. ℥iij.
solv. in
▽ flor. aur.
℥iv.
add.
Mell. despumat.
Syrup. d. Alth.
aa. ℥j.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. semin. Cin.
℥ß
Mell. despumat. q. s.

ad form. electuar.

D. S.

Alle 2 Stunden 1 bis 2 Caffeelöffel voll zu nehmen.

Mel rosatum.

(Rosenhonig).

Blos äusserlich anwendbar.

Formel.

Rec. Borac.

℥j.

Mell. rosat.

℥j.

D. S.

Zum Bepinseln.

Formel.

Rec. Rec. Tinct. Lacc.

℥j.

Mell. rosat.

℥vi.

M. D. S.

Davon mit einem Federchen von Zeit zu Zeit an das Zahnfleisch etwas zu streichen.

Meloes majales melle conditae.
(Mit Honig eingemachte Maiwürmer).

Dosis.

Von einem bis zu 3 Gran nach und nach.

Formel.

Rec. Mel. majal. mell. conditar.
N. iv.
Camphor.
Зß.
Liquor. ammon. acet.
℥iv.

M. D. S.

Vor dem Anfall einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Mixtura camphorata.
(Julep e Camphora).
(Kampfermixtur).

Dosis.

Von 20 bis zu 30 Tropfen,
1) entweder für sich,
2) oder reizenden Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Mixtur. camphorat.
℥ß.

Aether. sulphuric.
℥ß.

▽ cinnamom. vinos.
℥j.

M. D. S.

Stündlich einen Theelöffel voll zu nehmen.

(Für Kinder).

Formel.

Rec. Rad. Valer. minor.
Serpentar. virgin.
ā a. ℥iij.

infund. ▽ fontan.
fervid. suffic. quantit.
Colat. refrigerat.
℥vi.
add.
Mixtur. Camphor.
℥j.
Syrup. cinnamom.
℥vi.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.
(Für Erwachsene).

Mixtura oleosa balsamica.

(Balsamus Vitae Hoffmanni).

(Oelig-balsamische Mixtur).

Dosis.

Von 5 bis 10 bis 15 Trofen.

Formel.

Rec. Rad. Angelic. ℥iij.
infund. ▽ fontan.
fervid. suffic. quantit.
Colat. refrigerat. ℥iv.
add.
Aether. sulphuric. ʒj.
Mixtur. oleos. balsam. ℈ij.
Syrup. cinnamom. ℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Tinct. Valer. aether.
Mixtur. oleos. balsam. aa. ʒj.

M. D. S.

Stündlich 10 Tropfen in einem aromatischen Thee zu nehmen.

Mixtura pyro-tartarica.

(Mixtura simplex).

(Brenzligt weinsteinsaure Mixtur).

Dosis.

Von 15 Tropfen bis zu einer Drachme.

Formel.

Rec. Infus. flor. sambuc.

℥iv.

Tinct. Pimpinell.

℥iiß.

Mixtur. pyr. tartar.

℥ij.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Mixtur. pyr. tartar.

℥iij.

▽ flor. Sambuc.

℥iv.

M. D. S.

Abends vor dem Schlafengehen einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Mixtura sulphurico acida.

(Elixir acidum Halleri).

(Schwefelsaure Mixtur).

Dosis.

Von 10 bis zu 20 bis zu 25 Tropfen,

1) für sich mit Wasser,

2) mit einem Syrup oder andern Mischungen beigesetzt.

Formel.

Rec. Mixtur. sulphuric. acid. ℥jß.

Syrup. Cerasor. ℥jß.

M. D. S.

Tags 3mal 2 Theelöffel voll mit einer Tasse Wasser zu nehmen.

Formel.

Rec. Mixtur. sulphuric. acid. ℥j.

▽ aromat. ℥iv.

Tinct. Op. simpl. Gtt. xv.

Syrup. cort. aur. ℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Mixtura vulneraria acida.

(Aqua vulneraria Thedenii).
(Saure Wundmixtur).

Blos äusserlich anwendbar.

Natrum aceticum.

(Terra foliata Tartari crystallisata).
(Essigsaures Natrum).

Dosis.

Von 10 Gran bis zu einigen Drachmen, in Auflösung.

Formel.

Rec. Natr. acet.
℥ß.
solv. in
▽ Chaerefol.
℥iv.
add.
Mell. despumat.
Syrup. d. Alth.
aa. ℥vi.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Taraxac.

Extr. Marub. alb.

aa. ℥iij.

solv. in

▽ fontan.

℥vi.

add.

Natr. acet.

℥iiß.

Syrup. cortic. aur.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Natrum carbonicum crystallisatum.

(Alcali minerale Sal Sodae).

(Krystallisirtes kohlenstoffsaures Natrum).

Dosis.

Von einem Scrupel bis zu einer halben Drachme,

1) in Pulver,

2) in Auflösung.

Formel.

Rec. Natr. carbonic. crystallisat.

℥iß.

Elaeosacchar. citr.

℥j.

m. f. ℥.

D. S.

Alle 2 Stunden 1 Caffeelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Natr. carbonic. crystallisat. ℥ß.

solv. in

▽ fontan. ℥iv.

add.

Tinct. rh. aquos. ℥j.

Syrup. comm. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Natrum carbonicum siccatum.

(Trocknes, kohlenstoffsaures Natrum).

Dosis.

Von 5 bis 10 bis 15 Gran,

1) in Pulver,

2) in Auflösung.

Formel.

Rec. Natr. carb. siccat. Gr. v.

Sacchar. alb.

℈j.

m. f. 🝪.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Alle 3 Stunden ein solches Pulver in Wasser oder kalten Thee zu nehmen.

Formel.

Rec. Natr. carbon. siccat.

ʒj.

Elaeosacchar. foenic.

ʒj.

m. f. 🝪.

D. S.

Alle 2 Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Natr. carbon. siccat.

ʒiß.

solv. in

▽ Chaerefol.

℥vi.

add.

Syrup. foenic.

℥ß.

D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Natrum phosphoricum.

(Soda phosphorata).

(Phosphorsaures Natrum).

Dosis.

Von 2—6 Drachmen,
in Auflösung.

Formel.

Rec. Natr. phosphor. ℥ß.
solv. in
▽ rub. id. ℥vi.
add.
Tinct. rh. aquos. ℥vi.
Syrup. e. cichor. c. Rh. ℥ß.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen, bis Oeffnung erfolgt.

Natrum sulphuricum crystallisatum.

(Sal mirabile Glauberi).

(Krystallisirtes schwefelsaures Natrum).

Dosis.

Als auflösendes Mittel von 2 Scrupel, bis zu einer Drachme.

Als Abführmittel von einer halben bis zu 2 Unzen,

in Auflösung.

Formel.

Rec. Natr. sulphuric. crystallisat. ℥ß.

solv. in

▽ fontan. ℥iv.

add.

Syrup. comm. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Natr. sulphuric. crystallisat. ℥ß.

Extr. Taraxac. ʒiij.

Extract. Card. benedict. ʒiß.

solv. in

▽ flor. aur. ℥vii.

add.

Tinct. rh. aquos. ℥j.

Syrup. cortic. aur. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden anfangs einen, dann 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Natr. sulphuric. crystallisat.
Kal. nitr. depur.
ā a. ℥ß.
solv. in
▽ fontan. ℥viii.
add.
Syrup. Mann. laxat. ℥i.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen, bis Oeffnung erfolgt.

Natrum sulphuricum siccatum.

(Sal Glauberi comminutum).

(Ausgetrocknetes schwefelsaures Natrum).

Dosis.

Von einem Scrupel bis zu einer Drachme, in Pulver.

Formel.

Rec. Natr. sulphuric. siccat. ℥i.

flaved. cortic. aurant.

ʒß.

Elaeosacchar. citr.

ʒß.

M. fiat. pulv.

D. S.

Alle 2 Stunden eine Messerspitze voll zu nehmen.

Oleum Absinthii aethereum.

(Aetherisches Wermuthöl).

Dosis.

Von 1 — 5 Tropfen,

1) in einer geistigen Auflösung,

2) reitzenden Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Ol. Absinth. aether.

℈j.

solv. in

Aeth. sulphuric.

ʒiij.

add.

Syrup. cinnamom.

ʒij.

M. D. S.

Alle 3 Stunden 30 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Rad. Angelic.

℥iij.

infund. ▽ fontan.

fervid. suffic. quantitat.

Colat. refrigerat.

℥iv.

add.

Ol. Absinth. aether.

℈j.

Syrup. cinnamom.

℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum baccarum juniperi.

(Wachholderbeeröl).

Dosis.

Von 2—8 Tropfen,

1) in Pulver,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Ol. baccar. juniper.

℈ß.

Sacchar. alb.

℈j.

m. f. ℥.

Dividat. in quinque partes aequal.

D. S.

Alle 3 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Baccar. juniper. contus. ℥ß.

infund. ▽ fontan.

fervid. suffic. quantitat. p. ½ hor.

Colat. refrigerat. ℥viii.

add.

Ol. baccar. juniper. ℈j.

Syrup. opiat. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum corticum aurantiorum.

(Pomeranzenschalenöl).

Dosis.

Von 2—4 Tropfen,

in Pulver.

Formel.

Rec. Ol. cortic. aurant.

Gtt. ij.

Sacchar. alb.

℈ß.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Oleum florum Lavendulae.

(Lavendelöl).

Blos äusserlich anwendbar.

Formel.

Rec. Liquor. ammon. succinic.

℥ß.

Ol. destillat. Menth.

ʒß.

Lavendul.

ʒj.

M. D. S.

Zum Einreiben.

Oleum Herbae Majoranae.
(Majoranöl).

Dosis.

Von 1—2 Tropfen,
in Pulver.

Formel.

Rec. Ol. Majoran.
Gtt. ij.
Sacchar. alb.
℈ß.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. VI.
D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Oleum Menthae crispae.
(Krausemünzöl).

Dosis.

Von 3—4 Tropfen,
1) in Pulver,
2) Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Hb. Menth. crisp.
℥ß.
infund. ▽ fontan.
fervid. suffic. quantit. p. ¼ hor

Colat. refrigerat.
℥vi.
add.
Ol. Menth. crisp.
℈j.
Syrup. menth.
℥ß.
M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum menthae piperitae.

(Pfeffermünzöl).

Dosis.

Von 1 — 2 Tropfen,
1) in Pulver.
2) Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Ol. menth. piper.
Gtt. ij.
Elaeosacchar. citr.
℈ß.
m. f. ℞.
Dispensent. tal. Dos. N. VI.
D. S.

Bei heftigen Anfällen ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Rad. Valer. minor.

℥iij.

— Calam. arom.

℥ij.

infund. ▽ fontan. fervid.

℥viij.

Colat. refrigerat.

add.

Ol. menth. piper.

Gtt. xxiv.

Syrup. flor. aur.

℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll davon zu nehmen.

Oleum Origani Cretici.

(Dostöl).

Blos äusserlich anwendbar, oder allenfalls bei Odontalgie in den holen Zahn gelegt.

Formel.

Rec. Ol. origan. cret.

℈j.

D. S.

Nach Verordnung zu gebrauchen.

Oleum roris marini.

(Rosmarinöl).

Dosis.

Von 2—4 Tropfen,

1) in Pulver,

2) äusserlich wird es zum Einreiben angewendet.

Formel.

Rec. Ol. roris marin.

℈ß.

Sacchar. alb.

℈j.

m. f. ℥.

dividat. in quinque partes aequal.

D. S.

Bei heftigen Zufällen ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. succin.

℥ß.

Ol. roris marin.

℈j.

M. D. S.

Zum Einreiben.

Oleum Sabinae.

(Sevenbaumöl).

Dosis.

Von 1—3 Tropfen,

1) in Pulver,

2) Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Ol. Sabin.
Gtt. xv.
▽ Chaerefol.
▽ petroselin. aa. ℥ij.
Syrup. rh.
℥iß.
M. D. S.

Alle 2 Stunden einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum radicis Valerianae minoris.

(Baldrianöl).

Dosis.

Von 4 bis zu 6, bis zu 8 Tropfen.

1) in Pulver,

2) reitzenden Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Rad. Serpentar.
℥ij.

infund. ▽ fontan. fervid. ℥iv.

Colat. refrigerat.
add.
▽ chamom. ℥ij.
Ol. Valerian. minor. ℈j.
Syrup. cinnamom. ℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum Seminis Anisi.
(Anisöl).

Dosis.

Von 2 bis zu 6 bis zu 8 Tropfen,
1) in Pulver,
2) Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Sacchar. alb. ℥ß.
Ol. anis. ℈ß.
m. f. ♃.
D. S.

Theelöffelweise zu nehmen.

(Dies ist eigentlich der sogenannte Elaeosaccharum anisi).

Formel.

Rec. Semin. anis.
℥ß.
infund. ▽ fontan. fervid.
℥vi.
Colat. refrigerat.
add.
Ol. anis.
ʒß.
Syrup. foenic.
℥j.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum Seminis Carvi.
(Kümmelöl).

Dosis.

Von 1 bis zu 5 Tropfen,
1) in Pulver,
2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Semin. Carv.
ʒij.
infund. ▽ fontan. fervid.
℥iv.

Colat. add.

Ol. carv.

Gtt. xxv.

Syrup. menth.

℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rce. Ol. Carv.

℥ß.

▽ foenic.

℥iv.

Syrup. foenic.

℥iij.

M. D. S.

Bei heftigen Anfällen einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum Seminis Cumini.

(Römisches Kümmeloel).

Dosis.

Von 2 bis zu 8 bis zu 12 Tropfen,

1) in Pulver,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Hb. menth. piper.

℥iij.

infund. ▽ fontan. fervid.

p. ¼ hor.

Colat.

℥vi.

add.

Ol. Semin. Cumin.

℈j.

Syrup. cortic. aurant.

℥ß.

M. D. S.

Tags 3mal einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum Seminis foeniculi.

(Fenchelöl).

Dosis.

Von 3 bis zu 10 Tropfen,

1) in Pulver,

2) in Mixturen.

Formel.

Rec. Ol. foenicul.

Gtt. ij.

Sacchar. alb.

℈ß.

m. f. ℨ.

Dispensent. tal. Dos.

N. VIIII.

D. S.

Tags 3mal ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Ol. foenicul.

℈j.

▽ cinnamom.

▽ Meliss.

āa. ℥ij.

Tinct. cortic. aur.

℥j.

Syrup. foenic.

℥iij.

M. D. S.

3mal des Tags einen halben Eßlöffel voll zu nehmeu.

Formel.

Rec. As. foetid. depur.

℥iij.

Ter. c. vitell. ovor. sufficient. quantit. sub terendo add.

▽ foenicul.

℥iij.

Ol. foenic.

℈j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum Absinthii coctum.

(Gekochtes Wermuthöl).

Blos äusserlich anwendbar.

Formel.

Rec. Ol. absinth. coct. ℥j.

Tinct. Op. croc. ʒj.

M. D. S.

Zum Einreiben in den Unterleib.

Man kann es indeß auch von einer halben bis zu einer ganzen Unze den Klystieren beimischen und dann einspritzen.

Formel.

Rec. Infus. flor. chamomill. ℥vij.

Ol. Absinth. coct. ℥ß.

D. S.

Als Clystier einzuspritzen.

Oleum Coctum Chamomillae vulgaris.

(Gekochtes Chamillenöl).

Blos nur äusserlich anwendbar, nämlich zum Einreiben und dann auch zur Beimischung zu den Clystieren. Zum Clystier wendet man es von einer bis zu 2 Unzen an.

Oleum Hyoscyami.

(Bilsenkrautöl).

Man kann es mit vielem Glücke nicht nur äusserlich, sondern auch innerlich anwenden.

Formel.

Rec. Ol. Hyoscyam. ℥j.

Tinct. Op. crocat. ʒj.

M. D. S.

Zum Einreiben.

Formel.

Rec. Ol. Hyoscyam. ℥j.

D. S.

Beim Reiz zum Husten einen Caffeelöffel voll zu nehmen.

Man sehe hierüber *).

Oleum Hyperici.

(Johanniskrautoel).

Dieses Oel wird blos äusserlich gebraucht.

Vorzüglich benutzt man es als Zusatz zu dem unguentum elemi.

*) Wendt in Hufelands Journal der prakt. Arzn. und Wundarzn. B. v. St. 2. S. 381.

Oleum Amygdalarum.

(Mandelöl).

Dosis.

Von einer halben Unze bis zu vier Unzen. Man kann es entweder für sich geben, oder als Emulsion, oder mehreren Mitteln als Saft beimischen.

Formel.

Rec. Ol. Amygdalar.
dulc. ac. recent. expr. ℥ß.
fiat. c. ▽ fontan. ℥iv. emuls.
add.
Extr. Op. aquos. Gr. iiß.
Syrup. d. Alth. ℥j.
M D. S.

Alle Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen, und dann zu steigen.

Eine der gewöhnlichen Formeln, deren ich mich immer mit vielem Vortheil bediene, ist folgende:

Rec. Ol. Amygdalar.
dulc. ac. recent. expr. ℥j.

Pulver. gumm. arab.
℥ß.
▽ foenic.
℥vi.
Liquor. Ammon. anisat.
℥iij.
Syrup. Seneg.
gumm. ammon.
aa. ℥ß.
M. D. S.

Stündlich einen bis 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Gumm. ammon. depur.
arabic.
aa. ℥iiß.
Ter. c. vitell.
ovor. suffic. quantitat.
Sub terend.
add.
▽ foenicul.
℥iv.
Ol. Amygdalar.
℥vi.
Syrup. opiat.
℥ß.
M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Aqu. Meliss.
— flor. chamom.
ā a. ℥iij.
Ol. Amygdalar.
℥vi.
Kal. nitr. depur.
℥ß.
Extract. Op. aquos.
Gr. iij.
Syrup. emuls.
℥j.
M. D. S.

Stündlich einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen, und dann zu steigen.

Oleum Seminis Lini.
(Leinsaamenöl).

Dosis.

Von einer halben Unze bis zu 2 Unzen,
1) entweder alleine,
2) oder in Emulsionen,

Formel.

Rec. Ol. lin. rec.
℥j.
D. S.

Beim Reiz zum Husten einen Kaffeelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Ol. lin. rec.
℥j.
fiat. c. ▽ fontan.
℥viii. emuls.
in qua solv.
Kal. tartar.
℥ß.
add.
Tinct. rh. aquos.
℥j.
Syrup. comm.
℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Aeusserlich wendet man das Leinöl zu Clystieren an.

Hier wird es besser vertragen, als innerlich, weil sein Geschmack nicht der beste ist.

Oleum Ricini.

(Ricinusöl).

Dosis.

Von einer halben Unze bis zu 2 Unzen nach und nach,

1) entweder für sich,

2) oder abgerieben mit arabischen Gummi, mit Eidotter ꝛc.

Formel.

Rec. Ol. ricin. recent. expr. ℥j.
Ter. c. vitell. ovor.
suffic. quantit.
sub terendo
add.
▽ flor. sambuc. ℥iij.
▽ flor. chamom. ℥j.
Extr. Op. aquos. Gr. ijß.
Syrup. opiat. ℥ß.
M. D. S.

Alle anderthalb Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Rad. Alth. ℥ß.
Coqu. c. ▽ fontan. ℥viij.
Colat. add.
Ol. Ricin. recent. expr. ℥iß.

Syrup. emuls. ℥j.

M. D. S.

Stündlich 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Ol. ricin. recent. expr. ℥vi.

Syrup. Mann. laxat. ℥ß.

Mucilag. gumm. arab. ℥iij.

M. D. S.

Stündlich einen bis 2 Theelöffel voll zu nehmen.

(Für Kinder).

Oleum animale aethereum.

(Oleum animale Dippelii).

(Aetherisches Thieröl).

Dosis.

Von 5 bis zu 10 bis zu 30, ja bis zu 50 Tropfen,

1) entweder für sich auf Zucker,

2) oder mit ätherischen Tinkturen.

Formel.

Rec. Ol. animal. aether. ℈ij.

Aether. sulphur.
℥iiß.

M. D. S.

Alle Stunden 10 Tropfen in Chamillenthee zu nehmen.

Formel.

Rec. Aqu. cinnamom. vinos.
℥iij.

Spirit. sulphuric. aeth.
℥iß.

Ol. animal. aether.
ʒß.

M. D. S.

Stündlich 1 Theelöffel voll zu nehmen, und dann zu steigen.

Oleum animale foetidum.

(Oleum Cornu cervi foetidum).

(Stinkendes Thieröl).

Dosis.

Innerlich braucht man es von einem Tropfen bis zu 3, bis zu 6 Tropfen.

Formel.

Rec. Ol. animal. foetid.
℈ß.

Infus. flor. Sambuc.
℥iiß.

Succ. Sambuc. inspissat. ℥ß.

Syrup. d. Alth. ℥iij.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Sein äusserlicher Gebrauch ist vorzüglich zu empfehlen.

Formel.

Rec. Ol. animal. foetid. ʒiß.

aether. ʒj.

Unguent. hydrargyr. ciner. ℥ß.

M. D. S.

Zum bewußten Gebrauch.

Oleum Anisi sulphuratum.

(Balsamum Sulphuris anisatum).

(Geschwefeltes Anisöl).

Dosis.

Ehemals wandte man ihn von 20 bis zu 30 Tropfen innerlich an.

Gegenwärtig wird er nur noch hie und da äusserlich angewendet, weswegen ich jede Formel darüber weglasse.

Oleum Cacao.

(Butyrum Cacao).

(Kakaoöl).

Dosis.

Von 15 Tropfen bis zu einer Drachme.

Formel.

Rec. Ol. Cac.

℈ij.

Mucilag. gumm. arab.

℥iß.

Syrup. d. Alth.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum caryophyllorum.

(Nelkenöl).

Innerlich nicht anwendbar.

Jedoch ist es wegen seines äussern Gebrauchs sehr berühmt.

Oleum Cinnamomi.

(Zimmtöl).

Dosis.

Von einem bis zu 5 Tropfen.

Formel.

Rec. Ol. cinnamom.
℈ß.

Aether. acet.
ʒiß.

Syrup. cinnamom.
ʒij.

M. D. S.

Alle halbe Stunden 6—8 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Cortic. cinnamom.
ʒiij.

infund. ▽ fontan.
fervid. suffic. quantit. p. ¼ hor.
Colat. refrigerat.
℥iv.

add.
Ol. cinnamom.
℈j.

Syrup. flor. aur.
℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum Macis.

(Muskatenblüthöl).

Dosis.

Von einem bis zu 4 Tropfen.

Formel.

Rec. Ol. Mac.

℈ß.

▽ cinnamom. vinos.

℥iv.

Aether. sulphuric.

ʒß.

Syrup. cortic. aur.

℥iij.

M. D. S.

Stündlich 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Oleum Cerac.

(Wachsöl).

Ist sehr zweckmäßig als ein äusseres Mittel bei den bekannten Fällen zu gebrauchen.

Oleum chamomillae aethereum.

(Aetherisches Kamillenöl).

Dosis.

Von 4—6 Tropfen,

1) in Pulver,

2) Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Ol. chamomill. aether.

Gtt. iijj.

Sacchar. alb.

℈j.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Aqu. cinnamom. vinos. ℥iv.

Aeth. sulphuric. ʒj.

Ol. chamom. aether. ℈j.

Syrup. cinnamom. ℥ij.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum Galbani aethereum.

(Aetherisches Galbanumöl).

Wird blos äusserlich angewendet.

Formel.

Rec. Liniment. ammon. ℥j.

Ol. galban. aether. ℈j.

M. D. S.

Zum Einreiben.

Oleum laurini unguinosum.

(Salbenartiges Lorbeeröl).

Auch blos äusserlich anwendbar.

Oleum lini sulphuratum.

(Geschwefeltes Leinöl).

Ein Mittel, das man sonst häufig anwendete, das aber mit Recht jetzt ausser Gebrauch kam, indem andere wirksamere es ersetzen. Jede Formel darüber, würde also überflüssig seyn.

Oleum Nucistae.

(Muskatöl).

Blos äusserlich anwendbar.

Formel.

Rec. Tinct. Op. crocat.

℥ß.

Ol. nucist.

℈j.

M. D. S.

Zum Einreiben.

Oleum ovorum.

(Eieröl).

Auch blos äusserlich zu gebrauchen.

Oleum Succini.

(Bernsteinöl).

Dosis.

Von 4—8 Tropfen.

Formel.

Rec. Ol. succin. ʒß.
▽ cinnamom. vinos. ℥iij.
Tinct. Valer. aeth. ʒi.
Syrup. flor. aur. ℥iij.
M. D. S.
Stündlich 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Oleum Terebinthinae.

(Terbenthinöl).

Dosis.

Von einem bis zu 5 Tropfen, höchstens bis zu 10 und dieses nur allmälig.

Formel.

Rec. Aether. sulphuric. ʒj.
▽ flor. aur. ℥ij.
Ol. terebinth. Gtt. vj.

M. D. S.

Stündlich einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Aether. sulphuric. ℥iij.

Ol. terebinthin. ℥j.

M. D. S.

Früh Morgens jedesmal 60 Tropfen zu nehmen.

Dürande.

Formel.

Rec. Essent. as. foetid. ℥vi.

Sulfur. aurat. liquid. ℥iij.

Ol. terebinthin. ℥ij.

Alle 4 Stunden 30 Tropfen zu nehmen.

Marcus Herz.

Oleum Terebinthinae sulphuratum.

(Balsamum sulphuris terebinthinatum).

(Geschwefeltes Terbenthinöl).

Wird nur äusserlich angewendet.

Formel.

Rec. Ol. terebinthin. sulphurat. ℥vi.

Tinct. Op. crocat. ℥ij.

M. D. S.

Zum Einreiben.

Oxymel Aeruginis.

(Unguentum aegyptiacum).

(Grünspanessig).

Ebenfalls nur äusserlich anwendbar.

Oxymel scilliticum.

(Meerzwiebelhonig).

Dosis.

Für sich alleine von einer bis zu 2 Drachmen, oder Unzenweise Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Oxym scillitic. ℥ß.

Tinct. Op. simpl. ℈ß.

Syrup. d. Alth. ℥j.

M. D. S.

Stündlich 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. ammon. acet.
℥vi.
Infus. flor. Sambuc.
℥iij.
Oxym. scillit.
Syrup. opiat.
āā. ℥ß.
M. D. S.

Stündlich 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Lichen. island.
℥ß.
Coqu. c. ▽ fontan.
℥viij.
ad remanent.
℥iv.
Colat. add.
Oxym. scillit.
℥j.
Syrup. papaver. rhoead.
℥vi.
M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Oxymel simplex.

(Sauerhonig).

Dosis.

Von einer halben Unze, bis zu einer Unze,
1) entweder unter das Getränk,
2) oder Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Oxym. simpl. ℥ii.
D. S.

Davon einen Eßlöffel unter einen Schoppen Wasser zu thun, und dann zu trinken.

Formel.

Rec. Extr. taraxac.
gram.
ā a. ℥iij.
solv. in
▽ fontan. ℥iv.
add.
Oxym. simpl. ℥iß.
Syrup. d. Alth. ℥ß.
M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Pasta Althaeae.

(Altheepasta).

Formel.

Rec. Past. Alth.

℥j.

D.

Pasta Liquiritiae.

(Süßholzpasta).

Wird eben so wie die vorhergehende gebraucht.

Phosphorus.

(Phosphor).

Dosis.

Anfangs von $\frac{1}{4}$ Gr. nach und nach zu $\frac{1}{2}$ auch wol in dringenden Fällen bis zu 1 Gr.

1) in Auflösung von Schwefeläther,

2) in Auflösung von Oelen, oder in Emulsionen.

Formel.

Rec. Phosphor.

Gr. j.

solv. in

Aether. sulphuric.

℥iß.

add.

Syrup. cinnamom.

℥j.

M. D. S.

Alle Stunden 6 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Phosphor.

Gr. iß.

Ol. Amygdalar.

℥ij.

M. D. S.

Vor dem Anfalle einen Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Phosphor.

Gr. ij.

Subig. exact. trituration. long.

c.

Mucilag. gumm. arab. q. s.

vt f. c.

Aqu. fontan.

℥vi.

emuls.

Cui adde

Syrup. emuls.

℥j.

Spirit. sulphuric. aeth.

Gtt. xxx.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen, und dann zu steigen.

Hufeland.

Pilulae ex Resina Jalappae.

(Pilulae purgantes).

(Jalappenpillen).

Dosis.

6—8 Stück.

Formel.

Rec. Pilular. e Resin. Jalapp. N. xxx.

forment. ponder. Gr. ij.

D.

Davon 6 Stücke zu nehmen.

Plumbum aceticum.

(Saccharum Saturni depuratum).

(Essigsaures Blei).

Dosis.

Man hat ihn sonst meistens nur äusserlich angewendet, bis Herr Prof. von Hildenbrand zu Lemberg ihn auch innerlich in den bekannten Fällen zu verordnen anfieng. Man giebt ihn von $\frac{1}{4}$ bis zu einem halben Gr.

1) in Pulver,

2) in Auflösung.

Formel.

Rec. Plumb. acet.
Gr. $\frac{1}{4}$.
Puriss. op.
Gr. $\frac{1}{2}$.
flaved. cortic. aurant.
℈ß.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. VI.
D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Plumb. acet.
Gr. j.
solv. in
▽ flor. chamon.
℥iv.
add.
Tinct. Op. simpl.
Gtt. xiv.
Syrup. papaver. rhoead.
℥ß.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen, und dann zu steigen.

Der Bleizucker wird nun aber auch äusserlich mit vielem Vortheile angewendet.

Formel.

Rec. Plumb. acet.
Gr. viij.
Extr. Op. aquos.
Gr. iv.
solv. in
▽ fontan.
℥viij.
add.
Tinct. Myrrh.
℥ij.
M. D. S.
Zum äusserlichen Gebrauch.

Pulpa Cassiae.
(Kassienmark).

Dosis.

Von einer bis zu 2 Unzen.

Formel.

Rec. Pulp. Cass.
℥iß.
Tartar. depur.
℥j.
solv. in
▽ fontan.
℥vij.
add.
Syrup. e. cichor. c. Rh.
℥j.

M. D. S.

Stündlich anderthalb Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Pulpa Prunorum.

(Pflaumenpulpe).

Dosis.

Von einer Unze bis zu drey Unzen.

Formel.

Rec. Pulp. prunor. ℥ijß.
Natr. sulphuric. crystallisat. ℥vj.
solv. in
▽ fontan. ℥viiij.
add.
Syrup. Cerasor. ℥ß.

M. D. S.

Stündlich eine halbe Tasse voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Pulpa Tamarindorum.

(Tamarindenmark).

Dosis.

Von einer halben Unze bis zu 5 Unzen nach und nach.

Formel.

Rec. Pulp. Tamarindor.
℥ij.
Mann. calabrin.
℥vi.
solv. in
▽ flor. chamom.
℥viiij.
add.
Tinct. rh. aquos.
℥j.
Syrup. comm.
℥ß.
M. D. S.

Alle Stunden 2 gehäufte Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Pulvis aromaticus.
(Gewürzpulver).

Wird mehr als Gewürz zu Krankenspeisen und wie andere wohlriechende Pulver auch zum Bestreuen der Pillen angewendet.

Pulvis dentifricius.
(Zahnpulver).

Formel.

Rec. Pulver. dentifric.
℥j.

D. S.

Zahnpulver.

Pulvis gummosus.

(Loco Specierum Diatragacanthae).

(Gummiges Pulver).

Dosis.

Von 1 bis zu 3 Drachmen,

1) aufgelößt in Wasser oder Thee,

2) als Zusatz zu Mixturen.

Formel.

Rec. Pulver. gummos.

ʒß.

divid. in IV. part. aequal.

D. S.

Davon ein solches Pulver aufgelößt in Thee zu nehmen.

Formel.

Rec. Rad. Tormentill.

ʒß.

Coqu. c. ▽ fontan.

℥x.

ad remanent.

℥v.

Colat. add.

Pulver. gummos.

ʒij.

Tinct. Op. simpl.

℈j.

Syrup. emuls.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Pulvis ipecacuanhae compositus.

(Pulvis Doweri).

(Zusammengesetztes Ipekakuanhapulver).

Dosis.

Von 10—20—30 in dringenden Fällen auch wol bis zu 60 Gr.

Formel.

Rec. Pulver. ipecacuanh. composit.

ʒj.

dividat. in IV. part. aequal.

D. S.

Alle 4 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Pulvis liquiritiae compositus.

(Pulvis pectoralis).

(Zusammengesetztes Süßholzpulver).

Dosis.

Von 1 bis zu 2 Drachmen.

Formel.

Rec. Lichen. island.
℥iijß.
Coqu. c. ▽ fontan.
℥viii.
ad remanent.
℥iv.
Colat. add.
Pulver. Liquirit. compos.
℥iij.
Liquor. ammon. anisat.
℥ijß.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Pulvis opiatus.
(Opiumpulver).

Dosis.

Von 5 bis zu 10 Gr.

Formel.

Rec. Rad. Angelic.
℥ij.
calam. aromat.
℥iij.
infund. ▽ fontan. fervid.
suffic. quantitat.
Colat.
℥v.

add.
Pulver. opiat. ℈j.
Syrup. cinnamom. ℥ij.
M. D. S.
Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Pulvis rhei compositus.
(Zusammengesetztes Rhabarberpulver).

Dosis.

Von 2—5 Drachmen,

Formel.

Rec. Kal. tartar. ℥ß.
solv. in
▽ fontan. ℥iij.
add.
Tinct. rh. aquos. ℥j.
Pulver. rh. compos. ℥ij.
Syrup. Mann. ℥vj.
M. D. S.
Stündlich einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Pulvis sternutatorius.

(Niesepulver).

Jede Formel würde überflüssig seyn, da der Nahme dieses Pulvers sehr leicht und deutlich die Anwendung und Gabe voraussetzt.

Pulvis stibiatus.

(Loco Pulveris resolventis simplicis).

(Spießglanzpulver).

Ist veraltet, weshalb jede Formel überflüssig wäre.

Pulvis temperans.

(Temperierpulver).

Dosis.

Zu einer Drachme.

Resina Jalappae.

(Jalappenharz).

Dosis.

Für Kinder von 1—4 Gr. Für Erwachsene zu 6 Gr. bis zu 10 Gr. höchstens bis zu 15 Gr.

Man giebt es:

1) in Pillen,

2) in Emulsionen

Formel.

Rec. Resin. Jalapp.
℈j.
Hydrargyr. muriat. mit.
℈ß.
m. f. pilul.
N. 30.
Conspergant. pollin. Lycopod q. s.
D. S.

Davon 12 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Resin. Jalapp.
Gr. iij.
Ter. c. vitell. ovor.
Sacchar.
āa. ℨß.
sub terend.
add.
▽ rosar.
℥j.
Syrup. comm.
℥iij.
M. D. S.

Abführende Emulsion, früh nüchtern auf einmal zu nehmen.
(Für Kinder von einigen Jahren).

Formel.

Rec. Resin. Jalapp.

Gr. viij.

Ter c. vitell. ovor.

Sacchar.

aa. ℥iß.

sub terend. add.

▽ rosar.

℥ij.

Syrup. rub. id.

℥iij.

M. D. S.

Abführende Emulsion, früh nüchtern auf einmal zu nehmen.

(Für einen Erwachsenen).

Manche Aerzte lassen auch das Jalappenharz in Weingeist auflösen, wodurch dann die sogenannte Tinctura resinae Jalappae entsteht. Allein ich stimme für diese Auflösung nicht, indem es sehr leicht geschehen kann, daß sich hierdurch das Harz niederschlägt, und durch sein Ankleben den Organen der Digestion nachtheilig wird.

Resina ligni guajaci.

(Guajakharz).

Dosis.

Von 5 bis zu 10 bis zu 15 Gr.

1) in Pulver,

2) in Pillen,

3) in wässeriger und geistiger Auflösung.

Formel.

Rec. Resin. Lign. guajac. ℥iß.
Elaeosacchar. citr. ℥j.
m. f. ℥.
D. in scat.
S.

Alle 3 Stunden einen Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Resin. Lign. guajac.
Extract. gentian. rubr.
āa. ℨj.
fiant. c. Syrup. cortic. aurant. pilul.
N. 60.
D. S.

Tags 3mal 8 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Resin. Lign. guajac.

℥ij.

Ter. c. gumm. arab. suffic. quantit.

Sub terend.

add.

▽ flor. chamom.

℥vi.

Syrup. flor. aurant.

℥ij.

M. D. S.

Tags 3mal einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Resin. Lign. guajac.

℥ß.

solv. in

Tinctur. saponat. Jacob.

℥iij.

add.

Tinct. Op. simpl.

℈ß.

M. D. S.

Früh und Abends 10 Tropfen in vielem schleimigten Getränk zu nehmen.

Sapo guajacinus.

(Guajakseife).

Blos äusserlich anwendbar.

Formel.

Rec. Sapon. guajacin. ℥ß.

solv. in

Spirit. vin. rectificat. ℥iv.

D. S.

Zum äussern Gebrauch.

Sapo jalappinus.

(Jalappenseife).

Dosis.

Von 6—10—20 Gr.

1) in Auflösung von Weingeist, oder im destillirtem Wasser,

2) in Pillen,

3) in Emulsionen.

Formel.

Rec. Sapon. Jalapp. ℥ß.

solv. in

▽ calid. destillat. ℥ij.

add.
Syrup. e cichor. c. Rh.
℥ß.
M. D. S.

Alle 2 Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Formel.

Rec. Sapon. Jalapp.
Rad. Rh.
aa. ℥ß.
Extract. Taraxac.
℈ij.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
Conspergant. pollin. Lycopod. q. s.
D. S.

Alle Abend 8 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Sapon. Jalapp.
℥ß.
Ter. c. vitell. ovor.
Sacchar. alb.
aa. sufficient.
quantitat.
S. terend.

add.
▽ rub. id.
℥ij.
Syrup. comm.
℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Sapo medicatus.

(Seife zum medizinischen Gebrauch).

Dosis.

Von 20—40 Gr.
in Pillen.

Formel.

Rec. Sapon. medicat.
Gumm. ammon. depur.
aa. ʒj.
Extr. gramin.
ʒiß.
m. f. pilul. ponder. granor.
ij.

D. S.

Des Tags 3mal 8 Stücke zu nehmen.

Sapo stibiatus.

(Sapo antimonialis).

(Spießglanzseife).

Dosis.

Von 5—8 Gr.
in Pillen.

Formel.

Rec. Sapon. stibiat. ℥ß.
Pulver. rad. rh. ℈ij.
Extr. taraxac. ℥iß.
m. f. pilul. ponder. Gr. ij.
Conspergant. pulver. rad. Liquirit. q. s.
D. S.
Früh und Abends 8 Stücke zu nehmen.

Species aromaticae.

(Loco specierum pro cucuphis).

(Aromatische Species).

Können innerlich als Thee gebraucht, äusserlich zu Kräutersäckchen, Umschlägen angewendet werden.

Formel.

Rec. Specier. aromat. ℥j.

D. S.

Zum Thee.

Formel.

Rec. Specier. aromat. ℥j.

flor. chamom.

Hb. Meliss. conc.

āa. ℥ß.

D. S.

Zu Kräutersäckchen.

Species ad Cataplasma.

(Species zu Umschlägen).

Species ad Decoctum Lignorum.

(Species zum Holztrank).

Species ad Enema.

(Species zum Clystier).

Species ad Gargarisma.

(Gurgelspecies).

Species ad Infusum pectorale.

(Species zum Brusttrank).

Species resolventes externae.

(Zertheilende Species zum äusserlichen Gebrauch).

Species ad suffiendum.

(Species pro fumo).

(Räucherspecies).

Alle diese Species von den speciebus ad Cataplasma bis zu den speciebus ad suffiendum, werden auf die nämliche Art (nur hie und da mit einer kleinen Modification dem individuellen Charakter der Krankheit nach) wie die species aromaticae verschrieben, weshalb jede Formel darüber ein unnützer Ueberfluß seyn würde.

Spiritus Angelicae compositus.

(Loco spiritus theriacalis).

(Zusammengesetzter Angelikaspiritus).

Nur äusserlich anwendbar.

Formel.

Rec. Spirit. Angelic. compos. ℥j.

Tinct. Op. crocat. ʒj.

M. D. S.

Zum Einreiben.

Spiritus Camphoratus.

(Campherspiritus).

Ebenfalls nur äusserlich anwendbar.

Formel.

Rec. Spirit. Camphorat. ℥j.

Sapon. ℥ß.

M. D. S.

Zum äussern Gebrauch.

Spiritus Cochleariae.

(Löffelkrautspiritus).

Dosis.

Von 20 bis 30 bis 60 Tropfen.

Formel.

Rec. Hb. Digital. purpur. ℨß.

infund. ▽ fontan.
fervid. suffic. quantitat.
Colat. ℥iv.

add.

▽ cinnamom. ℥ij.

Spirit. cochlear. ℥ß.

M. D. S.

Alle 3 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen. Der Spiritus cochleariae ist auch sehr gut zum Gurgeln und zum bepinseln zu gebrauchen.

Formel.

Rec. Hb. Salv.
℥ß.
infund. ▽ fontan.
fervid. suffic. quantitat.
Colat.
℥viij.
add.
Mell. rosar.
℥j.
Spirit. cochlear.
℥ß.
M. D. S.

Zum Gurgeln.

Formel.

Rec. Pulver. Cortic. salic. vitell.
℥ß.
Coqu. c. ▽ fontan.
℥viij.
ad remanent.
℥iv.
Colat. add.

Mell. rosar.

℥iß.

Spirit. cochlear.

℥vj.

M. D. S.

Zum auswaschen und zum bepinseln.

Spiritus formicarum.

(Ameisenspiritus).

Spiritus Lavendulae.

(Lavendelspiritus).

Spiritus Roris marini.

(Rosmarinspiritus).

Spiritus Serpylli.

(Quendelspiritus).

Spiritus Mastiches compositus.

(Spiritus matricalis).

(Zusammengesetzter Mastixspiritus).

Alle diese Spiritus sind blos äusserlich anwendbar, jede Formel darüber würde überflüssig seyn, da man sich diese nach den schon oben angegebenen, in den vorkommenden Fällen leicht bilden kann.

Spiritus muriatico aethereus.
(Spiritus Salis dulcis).
(Aetherischer Kochsalzspiritus).

Dosis.

Von 30 — 40 — 60 — 100 Tropfen.

Formel.

Rec. Rad. Valer. minor.
Serpentar. virginian.
a a. ℥iij.
infund. ▽ fontan.
fervid.
℥viij.
Colat. add.
Spirit. muriatic. aether.
ʒiij.
Syrup. cinnamom.
ʒii.
M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll davon zu nehmen.

Formel.

Rec. ▽ cinnamom. vinos.
℥ij.
Spirit. muriatic. aether.
ʒiß.
Syrup. opiat.
℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen halben Eßlöffel voll davon zu nehmen.

Auch äusserlich kann er unter Gurgelwässer, und mit Honig zum auspinseln gebraucht werden, wie der oben angeführte Spiritus cochleariae.

Spiritus nitrico aethereus.

(Spiritus Nitri dulcis).

(Aetherischer Salpetergeist).

Dosis.

Von 20—30 Tropfen.

Formel.

Rec. ▽ flor. chamom. ℥iij.

Spirit. nitric. aether. ʒj.

Syrup. foenic. ℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Essent. Alexiph. Stahl. ʒiij.

Spirit. nitric. aether. ℈ij.

Syrup. cinnamom. ℥ij.

M. D. S.

Tags 3mal 30 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. flor. chamom. ℥iij.

Chin. aquos. ℥iß.

solv. in

▽ flor. aur. ℥iv.

add.

Spirit. nitric. aether. ℥ij.

M. D. S.

Stündlich einen halben Eßlöffel voll, zu nehmen.

Spiritus Saponatus.

(Seifenspiritus).

Blos äusserlich anwendbar.

Spiritus sulphurico-aethereus.

(Liquor mineralis anodynus).

(Aetherischer Schwefelgeist).

Dosis.

Von 20—30—60—80 Tropfen.

Formel.

Rec. Spirit. sulphuric. aether.

ʒiß.

▽ menth. piper.

℥iijj.

Tinct. Op. simpl.

℈j.

M. D. S.

Stündlich 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Spirit. sulphuric. aether.

ʒij.

Tinct. Valer. aether.

ʒi.

M. D. S.

Tags 3mal 30 Tropfen in Chamillenthee zu nehmen.

Formel.

Rec. Emuls. gumm. arab.

℥iv.

Camphor.

℈j.

Spirit. sulphuric. aether.

ʒij.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Rad. Caryophyllat. ℥iij.
Coqu. c. ▽ fontan. ℥viij.
ad remanent. ℥iv.
sub fine coct.
add.
Rad. Angelic. ʒiiß.
Diger.
Colat. refrigerat.
add.
Spirit. sulphuric. aeth. ʒj.

M. D. S.

Stündlich 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Cortic. peruv. opt. ℥ß.
infund. ▽ fontan.
fervid. sufficient. quantitat.
colat. refrigerat. ℥viij.
add.
Spirit. sulphuric. aeth. ʒij.

Syrup. opiat. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Spiritus sulphurico-aethereus martiatus.

(Liquor anodynus martialis).

(Eisenhaltiger Schwefeläthergeist).

Dosis.

Von 8—10—20 Tropfen.

Formel.

Rec. Spirit. sulphuric. aether. martiat. ℥ij.

Tinct. Op. simpl. ℈j.

M. D. S.

Des Tags 2mal 25 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. ▽ menth. piper. ℥iv.

Spirit. sulphuric. aether. martiat. ℈ij.

M. D. S.

Stündlich 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Rad. Gentian. rubr. ℥ß.
infund. ▽ fontan. fervid. ℥vi.
Colat. add.
▽ cinnamom. vinos. ℥ij.
Spirit sulphuric. aether. martiat. ʒj.
M. D. S.
Tags 3mal einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Spiritus Vini rectificatns.
(Rectificirter Weingeist).

Mehr äusserlich als innerlich anwendbar. So gebraucht man ihn mit vielem Vortheil zum Gurgeln nebst andern wirksamen Mitteln.

Formel.

Rec. Infus. Salv. ℥vi.
Mell. rosar. ℥iß.
Spirit. Vin. rectificat. ℥j.
M. D. S.
Zum Gurgeln.

Auch unter das Wasser mischt man ihn zum Getränk in den bekannten Krankheiten.

Formel.

Rec. Spirit. vin. rectificat.

℥j.

D. S.

Die Hälfte davon unter ein Seidel mit Wasser zu mischen und dann zu verbrauchen. Vorzüglich ist der Spiritus vini rectificatus zu Umschlägen und Einreibungen zu gebrauchen.

Spiritus Vini rectificatissimus.

(Höchst gereinigter Weingeist).

(Wein-Alkohol).

Ist ein Auflösungsmittel für viele Substanzen. So werden Aether haltende Oele, Harze, Kampfer, Ambra, Bernstein ꝛc. am besten in höchst gereinigtem Weingeist aufgelößt.

Spongia cerata.

(Wachsschwamm).

Ist blos in der Chirurgie üblich zur Erweiterung der Wunden.

Stibium oxydatum album ablutum.

(Antimonium diaphoreticum ablutum).
(Abgewaschenes weisses Spießglanzoxyd).

Ist ein unbrauchbares Mittel, weswegen wir jede Formel darüber für unnöthig halten.

Stibium oxydatum album non ablutum.

(Antimonium diaphoreticum non ablutum).
(Weisses nicht abgewaschenes Spießglanzoxyd).

Boerhave empfahl dieses Mittel vorzüglich. Man wendet es vorzüglich als ein sogenanntes auflösendes und schweißtreibendes Mittel an.

Dosis.

Von 5 — 10 — 30 Gr.

Darf nicht in Pulver gegeben werden, weil es an der Luft feucht wird.

Formel.

Rec. Stib. oxydat. alb. non. ablut. ℨß.
Infus. flor. Sambuc. ℥iv.
Syrup. d. Alth. ℥j.
M. D. S.
Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Stibium oxydulatum fuscum.

(Crocus metallorum).

(Braunrothes Spießglanzoxydulat).

Wurde ehemals von 2—3 Gr. um heftiges Erbrechen zu erregen, angewendet.

Bei dem Gebrauche anderer Mittel, können wir dieses nun entbehren.

Stibium purum.

(Regulus Antimonii).

(Reines Spießglanzmetall).

Dosis.

Wurde ehemals nach dem Vorschlage seines Lobredners des Friedrich Hoffmanns von 6 bis 20 Gr. gebraucht. Ist aber jetzt entbehrlich geworden, weswegen ich jede Formel darüber übergehe.

Stibium sulphuratum nigrum laevigatum.

(Antimonium crudum praeparatum).

(Geriebenes, geschwefeltes Spießglanz).

Dosis.

Von 10—20—30—60 Gr.

1) in Pulver,

2) in Bolus,

3) in Pillen.

Formel.

Rec. Stib. sulphurat. nigr. laevigat.

℈ß.

Magnes. carbon.

Gr. xiv.

Elaeosacchar. citr.

℈j.

m. f. ℥.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Stib. sulphurat. nigr. laevigat.

℈ß.

Magnes. carbon.

℈j.

Conserv. rosar.

q. s. vt f.

bol.

D. S.

Auf einmal zu nehmen.

Formel.

Rec. Stib. sulphurat. nigr. laevigat.

℥ß.

Extr. Taraxac.

Extr. Gram.

a a. ℈j.

m. f. pilul. ponder.

Gr. ij.

D. S.

Tags 3mal 5 Stücke zu nehmen.

Succus Dauci inspissatus.

(Roob Dauci).

(Eingedickter Möhrensaft).

Dosis.

Zu mehrern Drachmen.

1) entweder in Auflösung mit Wasser,

2) oder Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Rad. Alth.

℥ß.

Coqu. c. ▽ fontan.

suffic. quantit.

Colat.

℥viij.

add.

Kal. tartar.

ʒij.

Succ. Dauc. inspissat.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Succus Juniperi inspissatus.

(Roob Juniperi).

(Eingedickter Wachholdersaft).

Dosis.

Von einer bis zu 3 Drachmen, ja bis zu einer halben Unze und noch darüber,

1) in Auflösung mit Wasser,

2) zu Latwergen als Bindungsmittel.

Formel.

Rec. ▽ Juniper. ℥viij.

Kal. nitr. depur. ʒij.

Oxym. simpl.

Succ. juniper. inspissat. aa. ℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. rad. calam. arom. ℥ß.

Succ. Sambuc. inspissat.
q. s. vt f. electuarium

D. S.

Alle 2 Stunden 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Succus Liquiritiae depuratus.

(Gereinigter Süßholzsaft).

Dosis.

Für sich allein zu einer halben Drachme.

Ferner in wässerigter Auflösung.

Auch kann man ihn sehr gut gebrauchen, um mehrere Extrakte in Pillenform zu bringen.

Formel.

Rec. Succ. Liquir. depur.
℥ß.
solv. in
▽ rub. id.
℥vj.
add.
Syrup. Liquir.
℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Succus Sambuci inspissatus.

(Roob Sambuci).

(Eingedickter Hollunderbeersaft).

Dosis.

Man muß mehrere Wirkungen von diesem Mittel unterscheiden.

Als Schweiß und Harntreibendes Mittel giebt man es von 2—4 Drachmen, als abführendes Mittel giebt man es von 1—2 Unzen,

1) entweder alleine,
2) Mixturen beigesetzt,
3) als Zusatz zu Latwergen.

Dosis.

Rec. flor. Sambuc.
℥j.
infund. ▽ fontan.
fervid. suffic. quantit.
Colat.
℥x. ▽
add.
Kal. nitr. depur.
ʒij.
Succ. Sambuc. inspissat.
℥j.
Syrup. Liquirit.
ʒiij.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. ▽ flor. chamom. ℥vj.

Succ. Sambuc. inspissat. ℥j.

Tinct. Op. simpl. ℈j.

Syrup. flor. chamom. ℥iij.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. rad. Caryophyllat. ℥ß.

Succ. sambuc. inspissat. q. s.

vt fiat electuarium.

D. S.

Alle 2 Stunden 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Sulphur depuratum.

(Flores Sulphuris).

(Gereinigter Schwefel).

Dosis.

Von 10 — 15 Gr.

1) in Pulver,
2) in Pillen, jedoch seltener.

Formel.

Rec. Sulphur. depurat. ℥ij.
Kal. nitr. depur. ℥j.
Elaeosacchar. foenic. ℥j.
m. f. ℥.
D. in scat.
S.
Alle 3 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Sulphur. depurat. ℈ß.
Hydrargyr. muriat. mit. Gr. j.
Sacchar. alb. ℈j.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos.
N. VIIII.
D. S.
3mal des Tags ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Sulphur. depurat.
ʒj.
Puriss. Op.
Gr. iß.
Gumm. arab.
ʒjß.
Sacchar. alb.
ʒß.
m. f. ℥.
Dividat. in VI part. aequal.
D. S.

Alle 5 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Sulphur. depurat.
Magnes. sulphuric.
aa. ℈j.
Elaeosacchar. cinnamom.
ʒj.
m. f. ℥.
Dividat. in II part. aequal.
D. S.

Früh das eine Pulver, und Abends das andere zu nehmen.

Formel.

Rec. Sulphur. depurat.

Gumm. guajac.

$\overline{a}$a. ℥j.

Hydrargyr. muriat. mit.

℈j.

m. f. c. mucilag. gumm. Tragacanth. pilul. ponder.

Gr. ij.

D. S.

Früh und Abends 10 Stücke zu nehmen.

Auch äusserlich ist der gereinigte Schwefel anzuwenden.

Formel.

Rec. Sulphur. depur.

℥iij.

Sal. ammon. depur.

℈ij.

Axung. porc. q. s.

vt fiat unguentum.

D. S.

Zum bewußten Gebrauch.

Sulphur praecipitatum.

(Lac Sulphuris).

(Niedergeschlagener Schwefel).

Dosis.

Von 10—20 Gr.

in Pulver.

Formel.

Rec. Sulphur. praecipitat. ʒj.

Kal. nitr. depur. ʒij.

Elaeosacchar. citr. ʒß.

m. f. ℥.

Dividat. in VI. part. aequal.

D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver in Wasser zu nehmen.

Sulphur stibiatum aurantiacum.

(Sulphur auratum antimonii).

(Pomeranzenfarbener Spießglanzschwefel).

Dosis.

Ganz kleinen Kindern giebt man dieses Mittel von $\frac{1}{8}$—$\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$ Gr. nach und nach.

Aelteren Kindern giebt man es von $\frac{1}{2}$—1 Gr. Erwachsenen von 1—4 Gr.

1) in Pulver,

2) in Pillen,

3) in Mixturen.

Jedoch hier muß er jederzeit erst mit einem Gummischleim gerieben werden, damit er besser in der Mixtur aufgelößt wird.

Formel.

Rec. Sulphur. stibiat. aurant.

Gr. $\frac{1}{8}$.

Elaeosacchar. cinnamom.

Gr. iij.

m. f. ℥ subtilissim.

Dispensent. tal. Dos. N. VI.

D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver zu nehmen.

(Für ein Kind).

Formel.

Rec. Sulphur. stibiat. aurant.

Gr. $\frac{1}{2}$.

Puriss. Op.

Gr. $\frac{1}{4}$.

Sacchar. lact.

℈ß.

m. f. ℥. et tal. Dos.

N. VIIII.

D. S.

Alle 3 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Sulphur. stibiat. aurant.

Gr. jß.

Camphor.

Gr. j.

Elaeosacchar. foenicul.

℈ß.

m. f. ℥ et tal. Dos.

N. VI.

D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Sulphur. stibiat. aurant.

Calomelit.

aa. Gr. ¼.

Sacchar. alb.

℈j.

m. f. ℥ et tal. Dos.

N. VIII.

D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Sulphur. stibiat. aurant.

Hydrargyr. muriat. mit.

aa. ʒß.

m. f. c. Mucilag. gumm.

Tragacanth. pilul. ponder.

Gr. ij.

D. S.

Früh und Abends Anfangs eine Pille zu nehmen, und dann des Tags 5mal eine.

Formel.

Rec. Sulphur. stibiat. aurant.
Gr. iv.
Ter. c. Mucilag. gumm.
arab. suffic. quantit.
s. ter.
add.
▽ foenic.
℥iij.
Tinct. Op. simpl.
℈ß.
Syrup. foenic.
℥iij.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Sulphur stibiatum rubrum.

(Kermes minerale).

(Braunrother Spiesglanzschwefel).

Dosis.

Von ½ — 1 — 2 Gr.
1) in Pulver,
2) in Pillen.

Formel.

Rec. Sulphur. stibiat. rubr.
Gr. ½.
Kal. nitr. depur.
℈ß.
Elaeosacchar. citr.
℈j.
m. f. ℥. et tal Dos.
N. VIII.
D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Sulphur. stibiat. rubr.
Gumm. ammon. depur.
āa. ʒß.
Extr. taraxac.
ʒj.
m. f. pilul. ponder.
Gr. ij.
D. S.

Früh und Abends 3 Stücke zu nehmen, und dann zu steigen.

Syrupus Althaeae.

(Eibisch Syrup).

Dosis.

Von einer halben Unze bis zu einer Unze,

1) entweder für sich,

2) oder zu Säften gemischt,

3) oder zu Mixturen.

Formel.

Rec. Syrup. Alth.
Ol. Amygdalar. dulc.
aa. ℥iß.
Extract. Op. aquos.
Gr. iij.

M. D. S.

Brustsaft, davon alle 2 Stunden 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Mehrere Verbindungen dieses Syrups mit andern Mitteln, habe ich bereits schon hie und da angegeben.

Syrupus Amygdalarum.

(Syrupus emulsivus).

(Mandelsyrup).

Dosis.

Von einer halben Unze bis zu einer Unze.

1) für sich,

2) Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Gumm. arab.
℥ß.

solv. in
▽ rub. id.
℥iv.
add.
Elaeosacchar. foenicul.
℥ij.
Syrup. emuls.
℥vj.
M. D. S.

Beim Reiz zum Husten 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Auch von diesem Syrup sind oben schon mehrere Formeln angegeben.

Syrupus Berberum.

(Berbisbeersyrup).

Dosis.

Von 3 Drachmen bis zu einer Unze,

1) entweder für sich,

2) oder Mixturen beigesetzt.

Auch zum Getränk unter das Wasser kann man ihn sehr bequem mischen.

Syrupus Cerasorum.

(Kirschensyrup).

Dosis.

Von einer halben Unze, bis zu einer Unze.

Syrupus Mororum.

(Maulbeersyrup).

Syrupus Ribium.

(Johannisbeersyrup).

Syrupus Rubi idaei.

(Himbeersyrup).

Syrupus Succi Citri.

(Syrupus Acetositatis Citri).

(Zitronensaftsyrup.)

Alle diese Syrupe von Syrupo Cerasorum an, bis zu den Syrup. Succ. Citri werden in eben der Dosi gegeben, als die vorhingenannten, und eben in den Formen angewendet.

Syrupus Cinnamomi.

(Zimmtsyrup).

Dosis.

Von einer Drachme bis zu 2 Drachmen, Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. flor. Arnic.

ʒiij.

infund. ▽ fontan.
fervid. suffic. quantit. p. ¼ hor.
Colat. refrigerat. ℥vijj.
add.
Tinct. Valer. aeth. ℈ij.
Syrup. cinnamom. ℥ß.
M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Mehrere andere Verbindungen von diesem Syrup, habe ich schon oben angegeben.

Syrupus Corticum Aurantiorum.
(Pomeranzenschaalensyrup).

Dosis.

Von einer Drachme, bis zu 3 Drachmen, bis zu einer halben Unze,

1) Mixturen beigesetzt,
2) als Bindungsmittel zu Latwergen und zu Pillen.

Formel.

Rec. Summitat. Millefol. ℥ß.
infund. ▽ fontan.
fervid. ℥viij.

Colat. add.
Extr. flor. chamom.
ʒiij.
Syrup. cortic. aur.
ʒß.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. Cortic. peruv. opt.
ʒß.
Syrup. Cortic. aurant. q. s.
vt. f. etectuarium.
D. S.
Alle 2 Stunden 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Syrupus florum Aurantii.
(Pomeranzenblüthensyrup).

Dosis.

Von einer halben Drachme bis zu drey Drachmen.

Man setzt ihn Mixturen bey.

Formel.

Rec. Extract. calam.
ʒiiß.
solv. in
▽ menth. piper.
ʒiij.

add.
Tinct. Quass.
℥j.
Syrup. flor. aur.
℥ß.
M. D. S.
Tags 3mal einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Syrupus Liquiritiae.
(Süßholzwurzelsyrup).

Dosis.

Von 2 Drachmen bis zu einer halben Unze.

Formel.

Rec. Radic. Enul.
℥iij.
infund. ▽ fontan. fervid.
℥iv.
Colat. add.
Tinctur. Galban.
℥ij.
Syrup. Liquirit.
℥ß.
M. D. S.
Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Syrupus Mannae.

(Mannasyrup).

Dosis.

Von 3 Drachmen bis zu einer Unze.

Kindern giebt man ihn Theelöffelweise.

Man giebt ihn:

1) entweder für sich,

2) oder Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Extr. rh.

℥ß.

Kal. tartar.

℥ij.

solv. in

▽ flor. aurant.

℥iij.

add.

Syrup. Mann.

℥vj.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Syrupus opiatus.

(Loco Syrupi Diacodion).

(Opiumsyrup).

Dosis.

Von einer halben Drachme bis zu 1 Drachme,

für Kinder.

Von einer halben Unze bis zu einer Unze,

für Erwachsene,

in Mixturen.

Formel.

Rec. Syrup. opiat.

℥vj.

▽ Meliss.

℥iv.

Tinct. Op. simpl.

Gtt. xii.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Gumm. ammon. c. vitell. ov. subact.

℥iij.

Amygdal. dulc. rec. excorticat.

℥ß.

▽ foenic.

℥viij.

m. f. emuls.

Colat. dep.

add.

Syrup. opiat.

℥vj.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Syrupus rhei.

(Rhabarbersyrup).

Dosis.

Von einer halben Drachme, bis zu einer halben Unze.

Man giebt ihn Kindern für sich.

Ausserdem setzt man ihn Mixturen bey.

Formel.

Rec. Magnes. sulphuric.

℥j.

▽ rub. id.

Infus. Senn. compos.

aa. ℥iij.

Syrup. rh.

℥vj.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Syrupus Rhoeados.

(Klatschrosensyrup).

Von 2 Drachmen bis zu einer halben Unze, Mixturen beigesetzt.

Formel.

Rec. Extr. Arnic.

ʒiß.

solv. in

▽ flor. chamom.

℥vi.

add.

Syrup. rhoead.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Syrupus simplex.

(Gemeiner Syrup).

Dosis.

Wird zu einer beliebigen Menge übelschmeckenden Arzneyen beygemischt, welchen ich ihn auch schon hie und da zusetzte.

Syrupus Violarum.

(Veilchensyrup).

Dosis.

Kleinen Kindern giebt man diesen Syrup von einem bis zu 2 Theelöffel voll.

Ausserdem setzt man ihn von einer halben bis ganzen Unze Mixturen bey.

Formel.

Rec. Acid. Vitriol. dilut. ℥iij.

▽ rub. id. ℥iv.

Syrup. Violar. ℥vi.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Tartarus ammoniatus.

(Tartarus solubilis ammoniacalis).

(Ammoniumweinstein).

Ehedem wurde er eben so wie Liquor Ammonii acet. und wie Kali aceticum benutzt, gegenwärtig aber ist er nicht mehr in Gebrauch.

Tartarus boraxatus.

(Cremor Tartari solubilis).

(Boraxweinstein).

Dosis.

Als Auflösungsmittel von 20 — 30 — 60 Gr., als Laxiermittel von einer halben, bis zu anderthalb Unzen,

in Auflösung.

Formel.

Rec. Tartar. boraxat.

℥vj.

solv. in

▽ rub. id.

℥iij.

add.

Syrup. Cerasor.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Tartar. boraxat.

℥ß.

Extr. taraxac.

ʒiij.

solv. in

▽ fontan.

℥iv.

add.

Tinct. rh. aquos.

℥j.

Syrup. comm.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Tartar. boraxat.

℥iijß.

solv. in

▽ petrosel.

℥iij.

add.

Extr. gentian. rubr.

℥iij.

Tinct. Op. simpl.

℈j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Tartarus depuratus.

(Cremor tartari).

(Gereinigter Weinstein).

Dosis.

Als auflösendes Mittel giebt man den gereinigten Weinstein von 20—30 Gr. als abführendes Mittel von einer halben bis zu einer ganzen, auch wol bis zu anderthalb Unzen,

1) in Pulver,

2) in Auflösung,

3) in Latwergen.

Formel.

Rec. Tartar. depur. ʒij.

Elaeosacchar. citr. ʒiij.

m. f. ℥.

Dividat. in VI part. aequ.

D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver in Wasser zu nehmen.

Formel.

Rec. Tartar. depur.

Sulphur. depur.

aa. ʒj.

Elaeosacchar. foenic. ʒß.

m. f. ℥.

D. S.

Alle 2 Stunden eine Messerspitze voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Taraxac.

Gram.

aa. ʒß.

solv. in

▽ petrosel. ʒviij.

add.

Tartar. depur.

℥iij.

Syrup. foenic.

℥ij.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. Cortic. peruv. opt.

℥ß.

Coqu. c. ▽ fontan.

℥viij.

ad remanent.

℥iv.

Colat. add.

Tartar. depur.

℥iiß.

Syrup. opiat.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Rad. Scill. recent.

℈ij.

Coqu. c. ▽ fontan.
suffic. quantit.
sub fine coct.
add.
Rad. Calam. aromat.
℥iiß.
Diger. Colat. add.
Tartar. depurat.
℥ij.
Syrup. cortic. aur.
℥iij.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Tartar. depur.
℥iß.
Mann. calabr.
℥ij.
solv. in
▽ fontan.
℥ix.
add.
Syrup. Mann. laxat.
℥ß.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 gehäufte Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Formel.

Rec. Tartar. depurat.
℥iß.
Succ. Sambuc. insp.
q. s.
vt fiat electuarium.
D. S.
2 Eßlöffel voll davon zu nehmen.

Tartarus natronatus.
(Sal Seignette).
(Natron Weinstein).

Dosis.

Als auflösendes Mittel von 20 Gran bis zu einer Drachme. Als Abführungsmittel von einer bis zu 2 Unzen,

1) in Pulver,
2) in Auflösung.

Formel.

Rec. Tartar. natron.
depurat.
aa. ℥vj.
Elaeosacchar. citr.
℥j.
m. f. ♁.
D. S.
Tags 3mal 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Folior. Senn.
℥iij.
infund. ▽ fontan.
fervid. suffic. quantitat.
Colat.
℥vj.
add.
Tartar. natron.
℥vj.
Syrup. Mann.
℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 2 gehäufte Eßlöffel voll zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.

Tartarus stibiatus.

(Tartarus emeticus).

(Spießglanzhaltiger Weinstein).

Dosis.

Als auflösendes Mittel zu 1 Gr.

Als Brechmittel für Erwachsene von 1 — 2 — 3 Gr.

Als Brechmittel für Kinder von $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ — 1 Gr., ganz kleinen Kindern giebt man ihn von $\frac{1}{16}$, $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ Gr.

1) in Pulver,

2) in Auflösung.

Formel.

Rec. Tartar. stib.

Gr. j.

Pulver. Amyl.

℈j.

m. f. ℥.

D. S.

Auf einmal zu nehmen.

Hufeland.

Formel.

Rec. Tartar. stib.

Gr. j.

Pulver. rad. Ipecacoanh.

℈j.

Sacchar. alb.

℈ß.

m. f. ℥.

D. S.

Auf einmal zu nehmen.

Formel.

Rec. Tartar. stib.

Gr. iv.

Ammon. muriat.

ʒj.

Elaeosacchar. citr.

ʒß.

m. f. ℨ.

Dividat. in IV. part. aequal.

D. S.

Früh und Abends ein solches Pulver zu nehmen.

Formel.

Rec. Tartar. stib.

Gr. iij.

solv. in

▽ font. dest.

℥iij.

D. S.

Erwachsenen davon alle halbe Stunden einen Eßlöffel voll zu geben.

Kindern alle halbe Stunden einen Theelöffel voll, bis zur gehörigen Wirkung.

Formel.

Rec. Tartar. stib.

Gr. j.

▽ rub. id.

℥vi.

Oxym. scill.

℥j.

Extr. Taraxac.

ʒiiß.

Syrup. papaver. rhoead.

ʒiij.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Gumm. ammon. depur. ℥ii.
solv. in vitell.
ovor suffic. quantit.
add.
▽ foenicul. ℥iv.
Tartar. stib. Gr. j.
Oxym. scillit. ℥j.
Syrup. gumm. ammon. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. rad. Seneg. ℥iij.
Coqu. c. ▽ fontan. suffic. quant.
Colat. ℥vij.
add.
Ammon. muriat. ℥ß.

Tartar. stib.

Gr. j.

Syrup. Alth.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Terebinthina cocta.

(Gekochter Terpenthin).

Ist blos äusserlich anwendbar, und zwar zu Pflastern.

Tinctura Absinthii.

(Wermuthtinktur).

Dosis.

Von 30 — 80 Tropfen,

1) entweder für sich,

2) Mixturen, Elixiren beigesetzt.

Formel.

Rec. Tinct. Absinth.

℥ß.

Spirit. sulphuric. aether.

ʒj.

M. D. S.

Eine Stunde vor dem Mittagsessen, und eine Stunde nach demselben, 60 Tropfen mit etwas Wein zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. gentian. rubr. ℥j.

Chin. frigid. parat. ℈j.

solv. in

▽ flor. aur. ℥iij.

add.

Tinct. Absinth. ℥iij.

Syrup. cydon. ℥ß.

M. D. S.

Tags 3mal einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura amara.

(Bittere Tinktur).

Dosis.

Von 20—80 Tropfen.

Formel.

Rec. Elixir. aurant. compos. ℥j.

Tinct. amar. ℥ß.

M. D. S.

Stärkende Tropfen davon alle 3 Stunden 60 in Wasser zu nehmen.

Tinctura aromatica.

(Gewürzhafte Tinktur).

Dosis.

Von 20 — 60 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. aromat. ℥ß.

Cascar. ℨijß.

M. D. S.

Tags 3mal 40 Tropfen in Wein zu nehmen.

Tinctura aromatica acida.

(Loco Elixirii Vitrioli Mynsichti).

(Saure gewürzhafte Tinktur).

Dosis.

Von 20 — 100 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. aromat. acid.

Cortic. aurant.

āa. ℨiij.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 40 Tropfen in Chamillenthee zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Chin. aquos. ℨiij.

Extr. Cascar. ℥ij.

solv. in

▽ menth. piper. ℥iv.

add.

Tinct. aromat. acid. ℥ß.

M. D. S.

Tags 3mal einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Asae foetidae.

(Stinkasandtinktur).

Dosis.

Von 20—60 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. As. foetid. ℥ij.

Op. simpl. ℈j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 30 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Tinct. As. foetid.

Liquor. Ammon. anisat.

a a. ℥iij.

Alle Stunden 20—25 Tropfen zu nehmen. Der Gebrauch der Tincturae As. foetid. ist indeß mehr äusserlich, als innerlich.

Tinctura Benzoes.

(Benzoetinktur).

Dosis.

Von 8—20 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Benz.

ʒiß.

▽ foenic.

℥iiij.

Syrup. gumm. ammon.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen. Sie wird indeß mehr äusserlich als Waschwasser angewendet, daher sie auch unter den Namen Schönheitstinktur bekannt ist.

Formel.

Rec. Tinct. Benz.

℥ß.

▽ rosar.

℥ij.

D. S.

Zum äusserlichen Gebrauch.

Tinctura Myrrhae.

(Myrrhentinktur).

Dosis.

Von 30—60 Tropfen.

Formel.

Rec. Pulver. rad. Seneg.
℥iij.
Coqu. c. ▽ fontan.
℥viij.
ad remanent.
℥iv.
Colat. add.
Tinct. Myrrh.
℥iiß.
Syrup. Seneg.
℥j.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Benzoes composita.

(Balsamum Commendatoris).

(Zusammengesetzte Benzoetinktur).

Wird blos äusserlich angewendet.

Tinctura Cantharidum.

(Spanische Fliegentinktur).

Dosis.

Von 5—15 Tropfen mit Wasser oder einer andern Flüssigkeit vermischt.

Formel.

Rec. Tinct. Canthar.

℥ß.

Valer. aeth.

℥j.

M. D. S.

Stündlich 6—8 Tropfen mit einer Tasse Chamillenthee zu nehmen.

Auch äusserlich können wir die Tinktur sehr gut brauchen, und besonders da, wo die Anwendung des Pflasters nicht paßt.

Tinctura Cascarillae.

(Kaskarillentinktur).

Dosis.

Von 20—80 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Cascar.

℥ß.

cortic. aur.

℥ij.

M. D. S.

Tags 5mal 40—50 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver. Cortic. Cascar. ℥iij.

Coqu. c. ▽ fontan. ℥vj.

ad remanent. ℥iij.

Colat. add.

Tinct. Cascar. ℥ij.

Syrup. flor. aurant. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Cinnamomi cum Cassia cinnamomea.

(Zimmttinktur, mit Zimmtkassienrinde).

Dosis.

Von 30—60 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. cinnamom. ℥ij.

Aether. sulphuric. ℈ij.

M. D. S.

Stündlich 15—20 Tropfen in Pfeffermünzthee zu nehmen.

Formel.

Rec. Acid. sulphuric. dilut.

℥ij.

▽ aromat.

℥iv.

Tinct. cinnamom.

℥iij.

Syrup. opiat.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Mosch. opt.

Gr. xv.

Tinct. cinnamom.

℥ß.

M. D. S.

Stündlich einen Theelöffel voll zu nehmen.

Tinctura Catechu.

(Katechutinktur).

Dosis.

Von 30—80—100 Tropfen.

Formel.

Rec. Succ. Catech.
℥ß.
solv. in
▽ aromat.
℥viij.
add.
Tinct. Catech.
℥iiß.
Mucilag. gumm. arab.
℥ß.
Syrup. opiat.
℥iij.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Ausserdem wird die Tinctura catechu auch äusserlich angewendet, und zwar noch häufiger, als innerlich.

Formel.

Rec. Infus. Salv.
℥vj.
Tinct. Catech.
℥ß.
Mell. rosar.
℥vj.
M. D. S.

Zum Gurgeln.

Tinctura gentianae.

(Enziantinktur).

Dosis.

Von 20—80 Tropfen.

Formel.

Rec. Extr. Trifol. fibr.

ʒijß.

solv. in

▽ flor. aur.

℥iij.

add.

Tinct. gentian.

ʒij.

M. D. S.

3mal des Tags einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Ligni Guajaci.

(Guajaktinktur).

Dosis.

Von einer halben Drachme bis zu zwey Drachmen.

Formel.

Rec. Tinct. lign. guajac.

ʒij.

Op. simpl.

ʒß.

M. D. S.

Alle 5 Stunden 50 Tropfen zu nehmen.

Tinctura Pimpinellae.

(Pimpinelltinktur).

Dosis.

Von 20—40 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Pimpin.

℥iß.

Liquor. Ammon. anisat.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 50 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. acet.

℥j.

▽ flor. Sambuc.

℥iv.

Tinct. Pimpinell.

℥ij.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Castorei.

(Bibergeiltinktur).

Dosis.

Von 30 — 80 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Castor.

Spirit. sulphuric. aether.

a a. ℥iß.

Tinct. Op. simpl.

℈j.

M. D. S.

Stündlich 25 Tropfen zu nehmen.

Tinctura Castorei aetherea.

(Aetherische Bibergeiltinktur).

Dosis.

Von 15 — 30 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Castor. aether.

℥j.

Aether. sulphuric.

℈ij.

Tinct. Op. simpl.

℥ß.

M. D. S.

Stündlich 15 — 20 Tropfen zu nehmen.

Tinctura Chinae composita.

(Elixir roborans).

(Zusammengesetzte Chinatinktur).

Dosis.

Von 30 — 60 — 80 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Chin. compos. ℥j.

D. S.

Stärkende Tropfen, davon alle 3 Stunden 60 mit Wein zu nehmen.

Formel.

Rec. Elixir. c. Succ. Liquir. ℥j.

Tinct. Chin. compos. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. Quass. ℨij.

solv. in

▽ cinnamom. ℥ij.

add.

Tinct. Chin. compos. ℥ß.

Elixir. c. Succ. Liquir. ℥iij.

M. D. S.

Stündlich 2 Theelöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Pulver Cortic. peruv. opt. ℥ß.

infund. ▽ fontan.

fervid. suffic. quantit.

Colat. ℥viij.

add.

Tinct. Chin. compos. ℥iij.

Syrup. flor. aur. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Colocynthidis.

(Koloquintentinktur).

Dosis.

Von 10—20 Tropfen 2mal des Tags.

Formel.

Rec. Tinct. Colocynth. ℥j.

Op. simpl. ℈j.

Tinct. Valer. aether.

ʒj.

M. D. S.

Tags 3mal 18 Tropfen in Chamillenthee zu nehmen.

Tinctura Corticum aurantiorum.

(Pomeranzenschaalentinktur)

Dosis.

Von 10—40—60 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. cortic. aur.

ʒij.

aromat.

ʒj.

M. D. S.

Eine Stunde vor dem Mittagsessen und eine Stunde nach demselben 30 Tropfen mit etwas Wein zu nehmen.

Tinctura Euphorbii.

(Euphorbiumtinktur).

Wird gegenwärtig nicht mehr innerlich benützt. Es würde dies auch sehr nachtheilig seyn, da schon einige Tropfen eine Enteritis hervorbringen können.

Tinctura ferri muriatici.
(Tinctura Martis salita).
(Salzsaure Eisentinktur).

Dosis.

Von 15 — 30 — 40 Tropfen.

Formel.

Reç. Tinct. ferr. muriat.

℥iß.

Cortic. aurant.

℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 15 Tropfen zu nehmen.

Tinctura ferri pomati.
(Aepfelsaure Eisentinktur).

Dosis.

Von 20 — 40 — 60 — 80 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. ferr. pom.

℥ij.

Cascar.

℥iß.

M. D. S.

Alle 3 Stunden 30 Tropfen zu nehmen

Tinctura Guajaci ammoniata.

(Tinctura Guajaci volatilis).

(Ammoniachaltige Guajactinktur).

Dosis.

Von 20—40—80—100 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Guajac. ammon. ℥ij.

Liquor. Ammon. succin. ℥j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 20—25 Tropfen in Gerstenschleim zu nehmen.

Formel.

Rec. Extr. acon. ℈j.

Vin. stibiat. ℥ß.

Tinct. Guajac. ammon. ℥ij.

M. D. S.

Alle 3 Stunden 25 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. acet. ℥j.

▽ flor. Sambuc. ℥iv.

Tinct. guajac. ammon. ℥ij.

Syrup. opiat. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Kalina.

(Tinctura Antimonii acris. Tinctura Salis Tartari).

(Kalitinktur).

Dosis.

Von 40 — 60 — 80 — 100 Tropfen mit einer Theeschaale voll Wassers.

Jetzt gebraucht man sie nicht mehr so häufig wie ehemals.

Tinctura Opii benzoica.

(Elixir paregoricum).

(Mit Benzoe versehene Opiumtinktur).

Dosis.

Von 5 — 10 — 15 — 30 Tropfen.

Formel.

Rec. Rad. Valer. minor. ℥iij.

Serpentar. virgin. ℥ij.

infund. ▽ fontan.

fervid. suffic. quantitat.

Colat. ℥vj.
add.
Tinct. Op. benz. ʒiß.
Syrup. cinnamom. ʒiij.
M. D. S.
Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. anisat. ʒij.
Tinct. Op. benz. ʒj.
M. D. S.
Alle 3 Stunden 25 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Ol. Amygdal.
dulc. rec. ac frigid. expr. ℥j.
Mucilag. gumm. arab. ℥ß.
▽ foenic. ℥jv.
Tinct. Op. benz. ʒj.
M. D. S.
Beim heftigen Husten 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Opii crocata.

(Laudanum Liquidum Sydenhami).

(Gewürzhafte Opiumtinktur).

Dosis.

Von 4 — 8 — 12 Tropfen.

In manchem Fällen auch bis zu einem Scrupel, jedoch muß man immer hier sehr vorsichtig zu Werke gehen.

Formel.

Rec. Tinct. Op. crocat. ℈j.

▽ cinnamom. vinos. ℥iv.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Tinct. Op. crocat. ʒß.

Valer. aeth. ʒj.

M. D. S.

Alle Stunden 15 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Emuls. gumm. arab. ℥iv.

Tinct. Op. crocat. ʒß.

M. D. S.

Alle halbe Stunden 2 Theelöffel voll zu nehmen, und dann allmälig zu steigen.

Aber nicht blos innerlich leistet diese Tinktur ihre guten Wirkungen, sondern auch äusserlich gewährt sie vielen Nutzen, und zwar noch mehr als innerlich.

Sie kann sehr gut zum Einreiben, zum Eintröpfeln in das Auge bei manchen Arten von Augenentzündungen benutzt werden.

Formel.

Rec. Tinct. Op. croc.

℥vj.

Liquor. Ammon. succin.

℥ß.

M. D. S.

Zum Einreiben.

Formel.

Rec. Hydrargyr. muriat. corros.

Gr. j.

solv. in

▽ rosar.

℥iv.

add.

Tinct. Op. croc.

℈j.

M. D. S.

3mal des Tags einige Tropfen in das Auge fallen zu lassen.

Auch zu Clystieren kann die Tinctura Opii crocata sehr gut angewendet werden.

Die Gabe, in der man sie hier anwendet, ist von 20—40—60 Tropfen.

Formel.

Rec. Infus. Valer.
flor. chamom.
$\overline{aa}$. ℥iij.
Mell. sinc.
℥ß.
Tinct. Op. croc.
℈j.

M. D. S.

Zum Clystier.

Tinctura Opii simplex.

(Tinctura thebaica).

(Einfache Opiumtinktur).

Dosis.

Von 5 bis zu 8, bis zu 10, höchstens bis zu 15 Tropfen.

Die ausserordentlichen Dosen die bisweilen Aerzte verschreiben, gehören gewöhnlich zu

den Fällen, wo von einer grosen Gabe die Entscheidung der wichtigen Krankheit abhängt. Jedoch muß man immer mit vieler Behutsamkeit von den kleinern zu den stärkern Gaben übergehen.

Formel.

Rec. Tinct. Op. simpl.
℥j.
Liquor. Ammon. succin.
℥iß.
M. D. S.
Alle 3 Stunden 20 Tropfen zu nehmen.

Mehrere Verbindungen der Tincturae Opii simpl. mit infusis aromatischer Arzneikörper, habe ich schon oben angegeben.

Tinctura Pini composita.

(Loco Lignorum Tincturae).

(Zusammengesetzte Fichtentinktur).

Dosis.

Von 15 — 30 — 60 — 80 Tropfen.

Formel.

Rec. Extr. Cascar.
gentian. rubr.
aa. ℥iij.
solv. in

▽ aromat. ℥iv.

add.

Tinct. Pin. compos. ℥ij.

M. D. S.

Alle 2 Stunden einen gehäuften Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Rhei aquosa.

(Wässerige Rhabarbertinktur).

Dosis.

Von 2 Drachmen bis zu einer halben bis zu einer ganzen Unze.

Formel.

Rec. Tinct. rh. aquos. ℥vj.

▽ flor. aurant. ℥iij.

Spirit. sulphuric. aether. ℈j.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Infus. Senn. compos. ℥iij.

Tinct. rh. aquos. ℥ß.

Kal. tartar.

℥j.

Syrup. Cerasor.

℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen. bis Wirkung erfolgt.

Formel.

Rec. Natr. sulphuric. crystallis.

℥ß.

Extr. Taraxac.

ʒij.

Card. benedict.

ʒiß.

solv. in

▽ rub. id.

℥vj.

add.

Tinct. rh. aquos.

℥j.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Rosarum acidula.

(Säuerliche Rosentinktur).

Ist blos äusserlich zu benutzen.

Formel.

Rec. Tinct. Rosar. acidul.

℥ß.

Mell. rosar.

℥vj.

M. D. S.

Zum bepinseln.

Tinctura Succini.

(Bernsteintinktur).

Dosis.

Von 15 — 30 — 60 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Succ.

℥j.

Guajac. ammon.

℈ij.

M. D. S.

Alle 3 Stunden 25 Tropfen in Chamillenthee zu nehmen.

Tinctura Succini aetherea.

(Tinctura Succini balsamica).

(Aetherische Bernsteintinktur).

Dosis.

Von 15 — 30 — 40 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Succin. aether.

℥j.

▽ menth. piper.

℥iv.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Tinct. Succin. aeth.

ʒjß.

Camphor.

℈j.

▽ cinnamom. vinos.

℥iv.

Syrup. cinnamom.

℥iij.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Rad. Valer. minor.

Serpentar. virgin.

ā a. ʒiij.

infund. ▽ fontan.

fervid. suffic. quantit. p. ¼ hor.

Colat. refrigerat.

℥vj.

add.

Tinct. Succin. aeth.

ʒj.

Syrup. cinnamom.

℥ij.

M. D. S.

Alle halbe Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

(Bei sehr gesunkener Energie der Lebensthätigkeit).

Tinctura Valerianae ammoniata.

(Tinctura Valerianae volatilis).

(Baldriantinktur mit Ammoniak).

Dosis.

Von 30—60—80 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Valer. ammon. ℥j.

Aether. sulphuric. ℈ij.

▽ aromat. ℥iij.

M. D. S.

Alle halbe Stunden einen Eßlöffel voll zu nehmen.

(Bei sehr grosser Schwäche).

Vinum martiatum.

(Eisenwein).

Dosis.

Von 30—60—80—100—150 Tropfen.

Formel.

Rec. Vin. martiat.

℥iß.

D. S.

Davon 3mal des Tags 80 Tropfen zu nehmen.

Formel.

Rec. Tinct. aromat.

℥vj.

D. S.

Zu den obenbenannten 80 Tropfen jedesmal 30 Tropfen von dieser Tinktur zu mischen.

Vinum stibiatum.

(Aqua benedicta Rulandi. Vinum emeticum.)

(Spießglanzwein).

Dosis.

Als ekelmachendes Mittel von einer halben Drachme, bis zu anderthalb Drachmen.

Als Brechmittel von einer halben bis ganzen Unze für Erwachsene.

Als auflösendes Mittel von 20—30 Tropfen.

Als harntreibendes Mittel von 10—20 Tropfen.

Als Brechmittel für Kinder von ohngefehr 10—12 Jahren giebt man das vinum stibiatum von einer Drachme bis zu 2 Drachmen.

Kleinere Kindern für welche dieses Mittel das beste Brechmittel abgiebt, giebt man es von einem Scrupel, bis zu einer halben Drachme.

Noch jüngern Kindern giebt man es von 10 — 15 Tropfen.

Formel.

Rec. Extr. Hyoscyam.
℈j.
solv. in
▽ flor. aur.
℥iiij.
add.
Vin. stib.
ʒj.
M. D. S.

3mal des Tags einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Liquor. Ammon. acet.
℥j.
▽ flor. sambuc.
℥iij.
Tinct. Op. simpl.
℈j.
Vin. stib.
ʒj.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Formel.

Rec. Vin. stib.

℥j.

Syrup. Cerasor.

℥ij.

M. D. S.

Brechsaft, davon alle halbe Stunden 10—12 Tropfen zu nehmen, bis Wirkung erfolgt. (Für ältere Kinder ohngefehr von 6 Jahren).

Formel.

Rec. Vin. stibiat.

℈j.

Syrup. Cerasor.

℥j.

M. D. S.

Brechsaft, davon alle halbe Stunden 6 Tropfen zu geben.

(Für jüngere Kinder ohngefehr von 3 Jahren).

Zincum oxydatum album.

(Loco Florum Zinci).

(Weisses Zincoxyd).

Dosis.

Von 2—4—6—8 Gr. für Erwachsene.

Von $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{2}$—1—2 Gr. für Kinder.

Man giebt es
in Pulver.

Formel.

Rec. Zinc. oxydat. alb.
℈ß.
Puriss. Op.
Gr. jß.
Rad. Liquir.
ʒjß.
m. f. ℥.
Divid. in x part. aequal.
D. S.

Alle 2 Stunden ein solches Pulver in Pfeffermünzthee zu nehmen.

(Für Erwachsene).

Formel.

Rec. Zinc. oxydat. alb.
Gr. $\frac{1}{8}$.
Sacchar. alb.
Gr. ijj.
m. f. ℥.
Dispensent. tal. Dos. N. VI.
D. S.

Stündlich ein solches Pulver mit Chamillenthee zu geben.

(Für kleine Kinder).

Man kann dann allmälig steigen, bis zu einem halben Gran.

Auch zur Anwendung als Salbe läßt sich das Zincum oxydatum album recht gut benutzen.

Formel.

Rec. Zinc. oxydat. alb. ℥j.

Unguent. rosat. ℥ß.

D. S.

Zum äusserlichen Gebrauch.

Zincum purum.

(Reiner Zink).

Wird in der Medizin in dieser Gestalt nicht angewendet.

Zincum sulphuricum.

(Vitriolum Zinci).

(Schwefelsaurer Zink).

Dosis.

Wurde sonst als Brechmittel von 4—8—20 Gr. angewendet.

Sein innerer Gebrauch kann ganz entbehrt werden, da er öfters gefährliche Zufälle veranlaßt. Jedoch ist er äusserlich zu gebrauchen.

Anhang
zu dem
Recepttaschenbuch
über den
zweyten Theil
der
preussischen Pharmakopoe.

Acidum phosphoricum purum.
(Reine Phosphorsäure).

Dosis.

Von 10—15—30—40 Tropfen.

Formel.

Rec. Acid. phosphoric. pur.
ʒj.
▽ aromat.
℥iv.
Tinct. Op. simpl.
℈j.
Syrup. papaver. rhoead.
℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Herbae Chelidonii majoris.

(Grosses Schöllkrautextrakt).

Dosis.

Von 10 — 20 — 30 — 40 Gr.

1) in Pillen,

2) in Auflösung.

Formel.

Rec. Extr. chelidon. ℨiß.

Gumm. ammon. depurat. ℨj.

m. f. pilul. ponder. Gr. ij.

D. S.

Tags 3mal 8 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extract. chelidon. ℨij.

Taraxac. ℨiij.

solv. in

▽ comm. destill. ℥iv.

add.

Tinct. rh. aquos. ℨj.

Syrup. Cerasor. ℥ß.

M. D. S.

Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Extractum Senegae.

(Senegaextrakt).

Dosis.

Von 5 — 10 — 20 — 30 Gr.

1) in Pillen,

2) in Auflösung.

Formel.

Rec. Extr. Seneg. ʒj.

Myrrh. aquos. ℈ij.

Op. aquos. ℈ß.

m. f. pilul.

N. 45.

D. S.

Früh und Abends 6 Stücke zu nehmen.

Formel.

Rec. Extract. Seneg. ʒij.

Marrub. alb. ʒjß.

solv. in

▽ foenicul. ℥vj.

add.
Elixir. e. Succ. Liquir. ℥vj.
M. D. S.
Alle 3 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Syrupus balsamicus.
(Balsamischer Syrup).
Dosis.
Von einer halben Drachme bis zu drey Drachmen.
Formel.
Rec. Balsam. Copaiv. ʒiß.
Ter. c. Gumm. arab.
suffic. quantitat.
S. terend.
add.
▽ foenicul. ℥iv.
Syrup. balsam. ℥ß.
M. D. S.
Beim heftigen Husten einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Syrupus Croci.
(Saffransyrup).
Dosis.
Von einer halben Drachme, bis zu einer Drachme.

Ist ein sehr guter, besonders für kleine Kinder anwendbarer Syrup.

Formel.

Rec. Rad. Paeon.

℥iij.

infund. ▽ fontan.

fervid. sufficient. quantitat.

Colat.

℥v.

add.

Liquor. Ammon. succin.

℈j.

Syrup. Croc.

℥ß.

M. D. S.

Stündlich 2 Theelöffel voll zu nehmen.

(Für Kinder).

Syrupus Senegae.

(Senegasyrup).

Dosis.

Von 2 Drachmen bis zu einer halben Unze.

Formel.

Rec. Aqu. foenic.

℥iij.

Extr. Op. aquos.

Gr. ij.

Syrup. Seneg.

℥j.

M. D. S.

Stündlich einen Eßlöffel voll zu nehmen.

Mehrere Verbindungen dieses Syrups mit andern Mitteln, habe ich bereits schon oben angegeben.

Tinctura Valerianae simplex.
(Einfache Baldriantinktur).

Dosis.

Von 40—80—100—180 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Valer. simplic. ℨij.
▽ flor. aur. ℥iij.
Syrup. cinnamom. ℥ß.
M. D. S.
Stündlich 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Digitalis aetherea.
(Aetherische Fingerhuthstinktur).

Dosis.

Von 5—10—15—20 Tropfen.

Formel.

Rec. Hb. Digital. purpur. ℨß.
infund. ▽ fontan. fervid. ℥iv.
colat. refrigerat.
add.
Tinct. Digitat. aether. ℨj.

Syrup. opiat.

℥iij.

M. D. S.

Alle 3 Stunden 1 Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura ferri acetici aetherea.

(Aetherische Tinktur von essigsauren Eisen).

Dosis.

Von 5—10—15 Tropfen.

Formel.

Rec. Extract. ferr. pomat.

℥ij.

solv. in

▽ cinnamom.

℥iij.

add.

Tinct. ferr. acetic. aether.

℥j.

M. D. S.

Tags 3mal einen halben Eßlöffel voll zu nehmen.

Tinctura Rhei vinosa.

(Weinigte Rhabarbertinktur).

Dosis.

Als ein stärkendes Mittel von 40—60—80 Tropfen.

Als ein Abführmittel von 5 Drachmen bis zu einer Unze.

Formel.

Rec. Tinct. Rh. vinos. ℨß.

aromat. ℨiij.

M. D. S.

Alle Stunden 40—50 Tropfen zu nehmen.

Tinctura Valerianae aetherea.

(Aetherische Baldriantinktur).

Dosis.

Von 10—20—25—30 Tropfen.

Formel.

Rec. Tinct. Valer. aether. ℨi.

Mixtur. camphorat. ℨiij.

M. D. S.

Stündlich 25 Tropfen zu nehmen.

Mehrere Verbindungen dieser wirksamen Tinktur, mit andern flüchtigen Reizmitteln, habe ich schon oben angegeben.

Wegen Entfernung des Druckorts von Verfasser sind folgende Druckfehler eingelaufen.

S. 1. Z. 8. ergänze 3) zum bespritzen.
— 4. — 10. l. st. befeuchtet, gemischt.
— — — 5. l. ℥ij. für ʒij.
— 11. — 5. ist bei 10 bis 30 zu ergänzen.
— 12. — — setze nach Alumen, (Alaun) und zwar in die Mitte.
— 14. — 6. l. āā. ʒiij. für āā. ℥iij.
— 15. — 21. l. scatula für scutula.
— 16. — 17. l. — — — —
— 18. — 11. l. 56 für 66.
— 29. — 18. setze für Terr. ponderos. salit. Baryt. muriat.
— 30. — 21. l. ℈ß. für ℈j.
— 32. — 26. setze unter Antimonial-Schwefelwasser, Hufeland.
— 38. — 23. l. auch f. auf.
— — — 25. muß florum zu chamom. gezogen werden, und nicht zu vinos.
— 39. — 15. l. auch f. auf.
— — — 18. muß serpentar. vor virg. kommen und nicht vor minor.
— 40. — 8. l. auch f. auf.
— 45. — 9. l. ʒiij. f. ℥iij.
— — — 24. l. — — —
— 56. — 10. setze vor Myrrh. Extract.
— 64. — 15. setze ℈ß. f. ℈j.
— 66. — 11. setze N. VIIII. f. N. IV.

S. 68. Z. 2. setze vor flor. ▽.
— 71. — 20. setze unter Myrrh. und vor ℥ß. aa. ℥ß.
— 76. — 17. setze ℥iij. f. ℥iij.
— 80. — 14. setze vor flor. Sambuc. ▽ flor. Sambuc.
— 81. — 4. setze es sonst f. sie sonst.
— — — 6. setze es entbehrlich f. sie entbehrlich.
— 89. — — setze nach ℥iij. und zwar in die Mitte add.
— 92. — 6. setze für 18. 8—10 Stücke.
— 94. — 12. setze ferr. f. ferrum.
— — — 19 setze N. VIIII. f. N. IV.
— 101. — 11. setze Tragac. f. Trajac.
— 141. — — ist vor Centaur. minor. Extract. zu ergänzen.
— 142. — 16. muß das eine Rec. wegkommen.
— 145. — 5. setze Tropfen anstatt Trofen.
— 153. — 20. setze vor Card. Extract.
— 163. — 11. muß vor petroselin. ▽ kommen.
— — — 24. muß anstatt Forme, Formel gesetzt werden.
— 167. — 17. setze anstatt 3), 2)
— 178. — 23. setze anstatt ihn, es.
— — — 25. setze anstatt er, es.
— 212. — 21. setze vitell. f. vittell.
— 214. — 8. setze virginian f. virgimam.

Im Verlage der Steinischen Buchhandlung ist herausgekommen, und in allen soliden Buchhandlungen zu haben.

Ackermanni, J. C. G. opuscula ad Medicinae historiam pertinentia, c. fig. 8. maj. 2 fl. 30 kr. oder 1 Rthlr. 16 gr.

Auszüge medic. - chirurg. Beobachtungen aus den neuern Schriften der k. k. Akademie der Naturforscher, herausgeg. von G. Weinrich, 2 Bde, gr. 8. 2 fl. 45 kr. oder 1 fl. 20 gr.

Indagine, I. L. ab, Memorabilia Bismuthi, oder chemisch-physikal. Abhandlung zur Kenntniß des Wismuths und Magnesia, wie auch Antimonium föminium, 8. 54 kr. oder 14 gr.

Jourdain, Abhandlungen über die chirurg. Krankheiten des Mundes, und der damit verbundenen Theile, aus dem Franz. mit Kupf. gr. 8. 5 fl. 30 kr. oder 3 Rthlr. 16 gr.

Juch, Dr. C. W. neue Beiträge zur Chemie, mit 5 Kupf. gr. 8. 1 fl. oder 16 gr.

— — Verzeichniß chirurg. Instrumente, 8. 6 kr. oder 2 gr.

Juville's, Brucharztes zu Paris, Abhandl. über die Bruchbänder, und anderer bey Gebährmutter-Senkungen, Aftervorfällen, künstl. Aftern und Unenthalsamkeit des Harns anwendbaren Verbänden, aus dem Französ. von Profes. Schreger, mit 14 Kupf. gr. 8. illum. 4 fl. 30 kr. oder 3 Rthlr. schw. 2 fl. 15 kr. oder 1 Rthlr. 12 gr.

Melon, v., Abhandl. vom Mißbrauch des Aderlassens, oder Beweis, daß die Aderläße allzeit schädlich und oft tödlich sey, 2te Aufl. 8. 30 kr. oder 8 gr.

Pressavin, Abhandl. von den Nervenkrankheiten, 8. 1 fl. oder 16 gr.

Quer, B. J. Abhandlung von dem Nierenstein, und zuverläßige Mittel dawider, m. Kupf. 8. 20 kr. oder 5 gr.

Syndenhams, T. Anweisung zur Kur der mehresten Krankheiten, nebst einem Anhang vom Podagra und der Wassersucht, 2te Aufl. 45 kr. oder 12 gr.

Walther, Dr. allgemeine und auf wissenschaftl. Gründen beruhende Ansicht über die Entstehung und Behandlung der Verbrennung, 8. 12 kr. oder 3 gr.

Wedekind, G. C. F. de morborum primar. viarum vera notitia et curatione, editio nov. 4. 1 fl. 15 kr. oder 20 gr.

Wenzel, Abhandl. vom Staar, nebst Beobachtungen die Hornhaut und Kapsel der Crystallinse auf verschiedene Art zu öffnen, mit Kupf. 8. 56 kr. oder 9 gr.

Willburg, A. C. Betrachtung über die bisher gewöhnlichen Operationen des Staars, 8. 12 kr. oder 3 gr.

Bayerische StaatsBibliothek
Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Kapp, Georg Ludwig Karl,

Recepttaschenbuch über den zweyten Theil der preußischen Landespharmacopoe

Nürnberg 1809

M.med. 518
urn:nbn:de:bvb:12-bsb10287245-1